

補力康注射液

Prolyte Injection

本劑為維持正常生理，用於治療或預防組織、細胞體液間因滲透壓之異常或體內無機鹽之不足所引起之種種疾病。

組 成 Each ml contains :

主成分：

Calcium Chloride · 2H₂O.....0.368 mg

Sodium Chloride.....0.935 mg

Potassium Chloride.....1.190 mg

Magnesium Chloride · 6H₂O.....0.305 mg

Sodium Lactate.....1.340 mg

Sodium Acetate · 3H₂O.....1.630 mg

Dextrose · H₂O.....50.0 mg

賦形劑：

Water for injection

作 用 補充體液或體內電解質不足，代謝酸中毒之治療。作為燙傷、手術或外傷失血過多時，血漿之代用品。

適 應 症 手術或其他疾患之水分、電解質及營養的補給。

用法用量 靜脈點滴注射，通常成人一次用量為 500 mL~1000 mL，視病況需要而增減。

- 注意事項**
1. 本藥限由醫師使用。
 2. 運輸過程中，容器可能因重擊、震動，而產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
 3. 若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。
 4. 請依輸液套使用方法正確使用。
 5. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
 6. 使用前請再檢視，確認無異物後，方可使用。

包 裝 100 ml、250 ml、300 ml、500 ml、700 ml、1000 ml，玻璃瓶、塑膠瓶及塑膠軟袋裝。

儲 存 本品應避光儲存於 25°C 以下。

衛署藥製字第 042223 號

濟生化學製藥廠股份有限公司



CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION

新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 3 號

3353-02

電 話： (03) 5983811