

正面

SIZE: 179 X 129 mm

"健亞"健得靜錠0.5毫克(三氮二氮平)

Gendergin Tablet 0.5 mg (Alprazolam)

G-6413

衛署藥製字第 042514 號



作用:

1,4benzodiazepine類之 CNS 製劑可能是與 CNS 上幾處特定之立體接受體結合而發揮功效，確實機轉尚未明。臨牀上所有 benzodiazepine 化合物都具有抑制 CNS 的作用，按照劑量大小由稍微影響工作情緒到催眠作用。

成分:

每錠含 Alprazolam 0.5mg

賦形劑 :

Aerosil 200、Corn Starch、Lactose Fast Flow、Microcrystalline Cellulose 102、Erythrosine Aluminum Lake、Magnesium Stearate、Docusate Sodium。

適應症:

焦慮狀態。

說明:

適用於處理焦慮症或暫時舒解之，焦慮或日常生活的緊張、壓迫感，通常不需要抗焦慮劑的治療。對帶有抑鬱的焦慮也能生效。

用法用量:

通常劑量 0.25 ~ 0.5mg，一日三次，可視病人需要逐漸增加到每日最大量 4mg，分幾次投藥。老年或體衰之病人，通常初劑量是 0.25mg，一日二或三次，可視需要和耐受性而逐漸增大劑量。如果初劑量即讓病人產生副作用，則應減低劑量。

副作用:

一般病人最常見的副作用是本品藥理作用加大的結果，譬如思睡或頭昏眼花。其他與抗焦慮性 benzodiazepines 有關的副作用尚有：肌張力不足、興奮增盛 (irritability)、注意力不易集中、厭食、共濟失調、疲勞、鎮靜、口齒不清、黃疸、肌與骨衰弱、搔癢、複視、發育不良、慾望改變、月經不規則、尿失禁和滯留。與其他 benzodiazepines 相同，也曾產生矛盾的反應 (paradoxical reactions)，例如：興奮、精神激越、肌肉痙攣增加、睡眠干擾、幻覺及其他相反的行為反應。機率小而不定期，如果一旦發生應即時停止用藥。

禁忌:

已知對 benzodiazepine 過敏的病人，禁用本品。本品可使用在正接受適當療法之廣角性青光眼患者，但對狹角性青光眼是禁忌。

警告:

本品不能用來治療精神病患，也不能替代適當之精神病療法。因為具有抑制 CNS 的功效。同樣理由，正接受本品治療之患者，對於酒精及其他 CNS 抑制劑應保持謹慎。對於孕婦之胎兒，本品很可能造成傷害，如果懷孕期間使用本品或正在用藥時懷孕，應當評估對胎兒的危險性。

背面

SIZE: 179 X 129 mm

警語:

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

併用opiod類藥品

Benzodiazepine類藥品與opiod類藥品併用，可能導致重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

注意事項:

如突然停藥或迅速減量曾有禁戒發作之報導。本品是用在嚴重抑鬱病人或是有自殺傾向及計畫之人。如果長期和/或大量使用benzodiazepine之藥物，可能產生成癮和情緒、心理依賴性，因此，即使你覺得此藥"已不再有效"也別提高劑量。切勿斷然停藥，因為會有戒斷症狀產生。

使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品交互作用。

交互作用:

Benzodiazepine類藥物(包括本品)當併用其他影響神志、抗痙攣或抗組織胺、乙醇等抑制CNS的製劑時，會加成抑制CNS的效果。

懷孕:

畸胎影響：母親使用benzodiazepine，生育之子女出生後一段期間也許會有戒斷症狀的危險；同時還有新生兒無力的報導。

授乳:

必須使用本品的母親們不應哺乳。

用於兒童:

對18歲以下兒童之安全性和有效性尚未建立。

包裝:

Gendergin Tablet(alprazolam)有二種劑型

0.25mg，6～1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

0.5mg，2～1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

儲存於25°C以下。



410361

本藥須由醫師處方使用

健亞生物科技股份有限公司 製造
新竹縣湖口鄉中興村19鄰工業一路1號

ITO10F2