非類固醇 消炎鎮痛劑


“順華”伊普膜衣錠 600 毫克
（異布洛芬）

Ibuprofen Tablet 600mg “Shun Hwa”

【主成分】

Each tablet contains:

Ibuprofen ..... 600 mg



$C_{13}H_{18}O_2$=206.3

2-(4-Isobutylphenyl) propionic acid

為白色結晶性粉末，微具苦味及刺激味，幾不溶於水，但易溶於鹼性溶液及乙醇、丙醇及其他有機溶媒中。

【賦形劑】

Corn Starch、Lactose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose

【作用、特長】

1. 自胃腸道吸收迅速，藥效強勁，服用後 45 分鐘內，可達最高血中濃度。
2. 絕不在體內蓄積，於 24 小時內完全排泄體外，且大部分自尿中排出。
3. 具優異之消炎作用，能於短時間內，使炎症獲得顯著改善。
4. 具卓越之解熱作用，能作用於視丘下部之體溫調節中心，使體溫趨於正常。
5. 具快速之鎮痛作用，能迅速減輕疼痛症狀。
6. 風濕性關節炎患者每日投與 300mg、600mg、900mg 劑量時，其療效優於每日給予 3600mg Aspirin。

【毒 性】

急性毒性： LD 50mg/kg (72 小時值)

動物	投與法	♂	♀
Mouse	經口 皮下注射 腹腔內注射	1,025 490 540	900 400 500
Rat	經口 皮下注射 腹腔內注射	1,400 1,050 650	1,750 740 630

【適應症】

消炎、鎮痛（風濕性關節炎、風濕性關節痛、神經痛、神經炎、背腰痛）、外傷手術後之消炎、鎮痛。

【用法、用量】

按 Ibuprofen 計算通常成人一天 1200mg~2400mg 分 3～4 次飯後經口投與，依個人體質一天的最高劑量不得超過 3200mg，小孩得依年齡症狀適宜增減之。本藥須由醫師處方使用。

【一般注意事項】

1. 使用消炎鎮痛劑治療，乃為對症療法，而非原因療法。
2. 用於治療慢性疾患（慢性風濕性關節炎）時應考慮下列事項：
   （1） 長期投與時，須定期作臨床檢查（尿液檢查、血液檢查及肝機能檢查）如發現有異常現象，則須採取減量或停藥等適當措施。
   （2） 考慮採用非藥物性療法。
3. 用於治療急性疾患時，應考慮下列事項：
   （1） 對於急性炎症，須考慮其病痛及發熱程度而給藥。
   （2） 原則上應避免長期使用同一類藥品。
   （3） 如有原因療法，則應採用。
4. 須仔細觀察患者之狀況，留意是否副作用發生。可能出現過度體溫下降、虛脫、四肢冷卻等症狀，對患者有高燒之幼兒及高齡或消耗性疾患之患者，給藥後尤須注意觀察患者之狀況。
5. 本藥可能會遮蔽感染症之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。
6. 儘量避免與其他消炎鎮痛劑合併使用。
7. 對小兒及高齡患者，尤須注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投與。
8. 酒精警語：若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師你是否能服用 Ibuprofen 或其他鎮痛解熱劑，因為 Ibuprofen 可能造成胃出血。

【禁 忌 症】

1. 消化性潰瘍患者。
2. 重症之血液異常患者。
3. 重症之肝障礙患者。
4. 重症之腎障礙患者。
5. 重症之心機能不全患者。
6. 對本劑過敏之患者。
7. 患有阿斯匹靈 (Aspirin) 氣喘或曾有該病歷之患者。

【對下列患者須慎重投與】

1. 曾有消化性潰瘍病歷之患者。
2. 曾有血液異常或曾有該病歷之患者。
3. 患有肝障害或曾有此種病歷之患者。
4. 心機能障害之患者。
5. 曾有過敏症病歷之患者。
6. 支氣管氣喘之患者。

【副 作 用】

1. 血液：可能會引起再生不良性貧血、顆粒球缺乏症、血小板減少等血液障礙，故須作血液檢查並小心觀察。如有異常狀況出現，必須立刻停藥。
2. 過敏症：有時可能產生Stevens-Johnson症候群(發熱、皮膚黏膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎等症候群) Lyell 症候群(中毒性表皮壞死症)，發疹或誘發氣喘等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立刻停藥。
3. 感覺器官：
   （1） 眼：可能會有視覺異常等症狀出現，若有此等症狀出現時，必須立刻停藥。
   （2） 耳：可能出現重聽及耳鳴等症狀。
4. 肝臟：可能出現黃疸及氨基轉移酶 (Transaminase) 值異常等現象。
5. 消化器官：可能會引起胃腸出血，遇有此現象，必須立即停藥。有時亦可能會有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、胃部不快感等現象，或出現口內炎、便秘等症狀。
6. 精神及神經系統：有時會出現頭痛、暈眩及抑鬱等症狀。
7. 心臟血管系統：有時會出現低血壓等症狀。
8. 其他：可能會出現浮腫。

【孕婦及授乳婦人之投與】

根據動物實驗報告，本藥對動物胎兒具有毒性，對孕婦及授乳婦人之安全性尚未確立，對孕婦或可能懷孕之婦女及授乳婦人不要投與。

【保 存】

30°C 以下保存

【包 裝】

4-1000 錠，塑膠瓶裝/鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 042520 號

順華藥品工業股份有限公司
新北市三峽區二鬮路186號