115-150mm

410390

健諾心錠 2 公絲（甲磺酸多薩坐辛）

Genzosin Tablet 2mg (Doxazosin Mesylate)

衛署藥製字第 042378 號 G-6347

健諾心錠 4 公絲（甲磺酸多薩坐辛）

Genzosin Tablet 4mg (Doxazosin Mesylate)

衛署藥製字第 042874 號 G-6607

成份：

主成份：doxazosin。每錠含doxazosin mesylate salt相當於doxazosin 2mg或4mg。

賦形劑：

Microcrystalline Cellulose 102、Lactose Fast Flow、Dicalcium Phosphate Dihydrate、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

適應症：

高血壓、良性前列腺肥大。

說明：

健諾心錠可做為治療高血壓的第一線用藥，病人若單獨使用一種降血壓藥無法達到療效時，健諾心錠可和thiazide類利尿劑、ß-阻斷劑、鈣離子拮抗劑或血管加壓素轉化酶抑制劑併用。健諾心錠還可以舒張病患尿道旁的肌肉緩解良性前列腺肥大患者排尿不順暢的症狀。

用法用量：

高血壓劑量：健諾心錠的劑量範圍是每日1～16公絲，起始劑量為一公絲，一天一次，然後按照病人的反應，每隔1～2星期將日劑量調整為2公絲、4公絲、8公絲或16公絲（最大劑量），至病人血壓降至理想狀態為止，一般使用的劑量為每天2至4公絲。

良性前列腺肥大劑量：健諾心錠的起始劑量為一公絲，一天一次，然後按照尿動力學及BPH之徵候學將劑量調整為每天2公絲、4公絲、8公絲(最大劑量)。

腎功能不良病人之使用：因為健諾心錠的藥物動力學在腎功能不良的病人沒有改變亦無證據顯示健諾心錠會惡化腎機能不良的情況，因此腎功能不佳的病人可依一般的劑量給與。

小孩之使用：到目前為止無小孩使用之經驗。

禁忌：

對quinazolines過敏的病人。

警語及應注意事項：

藥品交互作用：大部份(98%)血漿中的doxazosin都和蛋白質結合，體外實驗資料顯示健諾心錠不會影響digoxin、warfarin、phenytoin或indomethacin和蛋白質的結合。

健諾心錠也不會和thiazide利尿劑，frusemide，ß-blockerks、非類固醇抗炎劑、抗生素、口服降血醣藥，促尿酸排泄劑或抗凝血劑等產生不良之藥物交互作用。

孕婦及授乳婦：在動物試驗中，大約300倍之人體最高劑量會降低胎兒的存活率，雖然未發現畸胎現象，但懷孕或授乳期使用本品的安全性尚未建立，因此孕婦或授乳婦應在醫師認為對母親及胎兒利多於弊時方可使用本品。

開車及操作機械之影響：使用健諾心錠會減弱患者駕駛及機械操作能力，尤其是在用藥初期。

不良反應：對照臨床試驗顯示高血壓病人，使用本品後最常見不良反應為姿勢性(少與暈厥有關)或非特異性的頭昏、頭痛、疲勞不適、姿勢性頭昏、暈眩、水腫、虛弱、嗜眠、噁心及鼻炎。極少數的病例被報告有尿失禁的現象。此現象可能與健諾心錠的藥理作用有關。下列的不良反應為治療高血壓曾被報告過之症狀，此類症狀在未服用健諾心錠時亦可能發生於高血壓之病人：心跳快速、心悸、胸痛、心絞痛、心肌梗塞、腦血管病變及心律不整。

過量：如果服用過量產生低血壓，病人應仰臥，頭部放低，如果需要的話，其它支持性療法也可使用，由於doxazosin和蛋白質結合率頗高，所以不能用透析除去。

藥理學特性：

藥效學特性 (Pharmacodynamic Properties):

健諾心錠經由選擇性和競爭性的阻斷突觸後α1-腎上腺索受體而產生血管擴張作用。健諾心錠經由降低全身血管阻力，而達明顯降壓效果，且一天服用一次可有效維持24小時的降壓效果，一般降壓作用於服藥後2小時達最高點，高血壓病人於服用健諾心錠期間，其仰臥和站立姿勢的血壓很相近。不像其它非選擇性α－腎上腺素受體抑制劑。長期服用健諾心錠少見血漿腎素活性的提高或心悸的產生。健諾心錠能產生有利的脂質代謝作用，可明顯提高HDL/total cholesterol比例，降低total triglcerides和total cholesterol的量。這是利尿劑和β-腎上腺素阻斷劑所沒有的優點，前二者對脂質代謝有不良作用，由於高血壓和脂質與冠狀動脈心臟疾病有關，健諾心錠對此二者具有利之作用效果，因此能降低引發冠狀動脈心臟病的危險性。使用健諾心錠治療時能減少左心室肥大，抑制血小板凝集和增強組織胞漿素原活化劑的活性，此外，健諾心錠能改善胰臟功能不良病人對胰島素的敏感性。健諾心錠不會產生不良的代謝作用，因此也適用於氣喘、糖尿病、左心室功能不良、痛風、良性前列腺肥大和老年的病人。

藥動學特性 (Pharmacokinetic Properties):

吸收-健諾心錠口服後吸收良好，約2小時可達血中最高濃度，對老年人及腎功能欠佳的病人之藥動學和年輕且腎功能正常者並無明顯差異，目前尚未對肝功能不良病人做試驗，也未對影響肝臟代謝的藥物(例如cimetidine)等進行藥品作用研究。

代謝/排泄-其末端血漿半衰期為22小時，所以一天只需服用一次。doxazosin大多會被代謝，只有小於5%以原型排出。

包裝：

本品備有2公絲、4公絲二種錠劑。

2公絲:2～1000錠塑膠瓶裝與鋁箔盒裝。

4公絲:2～1000錠塑膠瓶裝與鋁箔盒裝。

本藥須由醫師處方使用

410390

健亞生物科技股份有限公司　製造

新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

IT003D2