

【用法用量】

成人(15歲以上)	一次1錠，一日3至4次，於三餐飯後及就寢前服用。
12歲以上未滿15歲	一次2/3錠，一日3至4次，於三餐飯後及就寢前服用。
12歲以下	不得服用，請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化系統	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加快、排尿困難、視覺模糊

二、服用本藥後，若有以下症狀時，請立即停用，並接受醫師診治：

- (一)有任何不適情況產生。
- (二)咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、濃痰、疹子或持續性頭痛。
- (三)症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒或發燒持續三日。
- (四)喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五)服用過量【Acetaminophen每日超過4,000毫克(mg)】，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六)有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】

6-1000錠鋁箔盒裝。

【作用】

- ◎非阿斯匹林解熱鎮痛劑(Acetaminophen)－減輕感冒所引起之全身痠痛並具解熱功能，藥效溫和，不傷腸胃。
- ◎非麻藥類鎮咳劑(Dextromethorphan Hydrobromide)－可直接抑制咳嗽中樞來抑制咳嗽反射作用，鎮咳作用比Codeine強，無習慣性，能有效的緩解咳嗽症狀。
- ◎支氣管擴張劑(dl-Methylephedrine Hydrochloride)－並無以往Ephedrine Hydrochloride之心跳加快或血壓增高等副作用，能消除支氣管痙攣。
- ◎抗組織胺劑(dl-Chloropheniramine Maleate)－為抗組織胺藥(Antihistamine)，緩解流鼻水、打噴嚏等症狀。
- ◎中樞神經興奮劑(Caffeine Anhydrous)－能改善毛細血管之血流循環，增強其他成份的鎮痛（尤其是頭痛）效果。
- ◎祛痰劑(Guaifenesin)－能減少支氣管分泌物之黏度，並可促進黏液從呼吸道排出，有顯著之祛痰作用。增加呼吸道液體的流動，更具緩解咳嗽的效力。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】

25°C以下。

衛署藥製字第 G-6770 號
043127



新萬仁化學製藥股份有限公司
Hsin Wan Jen Chemical & Pharmaceutical Co.,Ltd.
台中市豐原區文賢街158號