綜合感冒治療劑

傷風克錠

GRIPPETIN Tab.

【成分】每錠中含有:

【有效成分及含量】

Acetaminophen 325mg、dl-Methylephedrine Hydrochloride 10mg、Caffeine Anhydrous 50mg、dl-Chlorpheniramine Maleate 2mg、Guaifenesin 120mg、Dextromethorphan Hydrobromide 15mg。

【其他成分(賦形劑)】

Avicel PH101、Cellkol 103、Primojel、Magnesium stearate、Aerosil、Tartrazine。

【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、喀痰、關節痛、肌肉痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者,請勿使用:

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

(二)服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型憂鬱劑(SSRI)的人。

二、有下列情形者,使用前請洽醫師診治:

(一)12歲以下。

(二)有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。

(三)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。

(四)有呼吸疾病的人:如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、或呼吸困難,及青光眼、因前列腺肥大引起之排尿困難的人。

(五)有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)正在服用其他綜合感冒藥、止咳化痰藥、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

(三)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

(四)服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項:

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)不要服用本藥超過7日。

(五)服用過量Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品,但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

(六)酒精警語:不得併服含酒精飲料,因Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

(七)可能引起嗜睡,勿駕車或操作危險性機械。

(八)避免再服用咖啡因藥品、飲料,過多的咖啡因會引起神經緊張,興奮與失眠,且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害,不可長期使用。

稿件名稱:傷風克_仿單	客戶簽名:
製　　稿:內容、條件確認	
第 1 次校對 108 年 07 月 31 日	

列印與實際印刷略有色偏請依檔案內設定為主。客戶若是對於稿件確認無誤,請簽名。