“合誠”好克痛錠100毫克
Hocoton Tablets 100mg “H.C.”

Aspirin原為良好之解熱鎮痛劑，近年來隨著醫藥界的研究發現，它具有預防心臟病的功效，尤其在低劑量投與時，具有不可逆性阻斷Thromboxane A2形成之作用而減少血栓形成，因而應用於預防心肌梗塞之發作，預防腦中風及腦部缺血之發作。

【主 成 分】：每錠含

Aspirin.....100mg

【賦 形 劑】：Acacia、Calcium Carboxymethylcellulose、Lactose、Orange Powder、Starch、Stearic Acid、Talc、Sodium Saccharin、Mannitol、Tartrazine、Povidone

【適 應 症】：

預防心肌梗塞、預防心栓性栓塞症、男性短暫性缺血性發作。

【用法用量】：每天服用一錠。

本藥須由醫師處方使用。

【禁　　忌】

1、曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。

2、嚴重肝、腎疾患、血友病或其他出血性疾患禁用之。

3、懷孕第3期。

【注意事項】

1、由於本藥使用後會延長出血時間，故欲接受手術之患者應於手術前一週停藥。

2、曾經因使用Aspirin發生氣喘之患者或消化性潰瘍之患者應小心使用。

3、本藥與抗凝血劑併用時宜謹慎監測血液之凝集情形。

4、服用本藥若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

5、本藥應置於小孩伸手不及處。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，而懷孕第三期之孕婦應避免服用。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之有益性及必要性方始投與。

【副 作 用】

副作用極為輕微，偶有胃腸不適、噁心、嘔吐、胃黏膜受損、潰瘍等現象。

【警　　語】

1、不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。

2、本藥不宜使用於12歲以下兒童，亦不宜使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群(Reye’s Syndrome)有相關性。

3、蠶豆症(6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不宜服用本藥。

【許可證字號】：衛署藥製字第043139號

【包　　裝】：2~1000錠塑膠瓶及鋁箔盒裝

【儲　　存】：室溫(15~30℃)以下保存。

適用藥害救濟制度

合誠化學製藥股份有限公司
桃園市平鎮區工業十路15號Ⓐ