


附件(證照)粘貼表

產品名稱	密可梳 外用液	申請廠商	瑞安大藥廠股份有限公司
衛生署給證號碼	字第 043933 號		

修
改




G.M.P. 優良藥品	衛署藥製字第0	60ml
"瑞安"	成份：每ml含 Minoxidil.....	Topical Solution 20mg/ml
"Purzer"	適應症： 雄激素性禿髮 說明： 本品用於雄激素性禿髮之男性及女性病人可刺激毛髮 止落髮。 用法用量： 醫師藥師藥劑生指示藥品 本品僅供外用，需按指示使用，不可用於身體任何其 由患部中心開始，用於頭皮，每日兩次。此劑量與患 關。每日總劑量不可超過2ml，使用本品後，須徹底 用本品時，毛囊及頭皮須完全乾燥。	MIXIL Purzer MINOXIDIL..... Each ml contains: 20mg "Purzer"
[成份] 每ml中含： Minoxidil.....	注意事項： 用於兒童：用於18歲以下的患者安全性及有效性尚未建 用於老年人：用於65歲以上的患者安全性及有效性尚未 用於懷孕及授乳期：用於孕婦之作用未明。全身 Minoxidil會經人類乳汁排出，孕婦或授乳婦不可使用本 禁忌： 本品禁用於已知對Minoxidil，或配方中任何其他成份過敏 患者。 副作用： 在臨床試驗中，本品常見之副作用為頭皮輕微的皮膚炎，不常 見之副作用，包括刺激性皮膚炎（發紅、鱗屑剝落、和灼熱感）， 非特異性過敏反應，尋麻疹、過敏性鼻炎、面部腫脹、敏感、呼吸 急促、頭痛、神經炎、頭昏眼花、頭重腳輕、昏厥、眩暈、水腫、 胸痛、血壓改變、心悸和心博率改變。罕見之副作用，包括過敏 性、接觸性皮膚炎、毛囊炎、禿髮、不期望的毛髮病和皮脂漏。 交互作用： 目前尚無，但同時服用Guanethidine之患者有加強姿勢性低血 壓之可能性。 過量及誤食： 誤食可能產生與本品之血管擴張作用有關之全身性效應。 藥物過量之徵兆和症狀最可能者為心臟血管作用及伴有液體滯 留，血壓降低及心跳過速，液體滯留可以適當之利尿療法處理。心 跳過速可投與B交感神經阻斷劑控制。 症候性低血壓可靜脈注射生理食鹽水加以治療。 擬交感神經藥物如norepinephrine及epinephrine具有過度刺 激心臟之作用，應避免使用。 儲存於室溫15°C~30°C 本品為澄清無色至淺色，顏色不影響藥效 包裝：4000公撮~以下塑膠瓶裝。	NO: Lot No: 有效期限二年 Mfg Date: C0404102

89.10.6-

製造商：瑞安大藥廠股份有限公司
桃園縣觀音鄉觀音工業區大同一路26號
電話：(03) 483-9641 ~ 3
台北市民族西路225巷7弄4號7樓
電話：080-221308

G.M.P.優良藥品
"瑞安" 密可梳
"Purzer"

[成份]
每ml中含：
Minoxidil.....



G.M.P.優良藥品 G-7203 號

衛署藥製字第 043933 號

【適應症】及用法用量 詳閱說明書

"瑞安"

密可梳 外用液
20公絲/公撮
"Purzer"
Mixil 20mg/ml
Topical solution

醫師藥師藥劑生指示藥品
存放在陰涼處

【成份】
每ml中含：

Minoxidil..... 20mg

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.
瑞安大藥廠股份有限公司
桃園縣觀音鄉觀音工業區大同一路 26 號

