

衛署藥製字第044120號GMP G-7334

貝達欣點眼液 Betacin Ophthalmic Solution

Each ml contains :

- 【主成分】： Betamethasone(as sodium phosphate).....1mg
Gentamicin (as sulfate).....3mg(potency)
- 【賦形劑】： Sodium Citrate、Dibasic Sodium Phosphate、Sodium Borate、Methyl Paraben、Sodium Metabisulfite、Sodium Chloride、Glycerin、l-Menthol、Camphor、Distilled Water add to 1ml
- 【作用】：本品是由具有抗過敏活性的Betamethasone和具有廣效型殺菌活性的Gentamicin組合而成的。Betamethasone可以抑制機械化學或天然過敏原刺激所引起的眼睛過敏反應。Gentamicin對廣泛的革蘭氏陽性菌G(+)、革蘭氏陰性菌G(-)所引起的眼疾，有良好的殺菌效果。
- 【適應症】： 驗炎、角膜炎、鞏膜表面炎、淚囊炎、驗腺炎、角膜潰瘍、結合膜炎、結合性角膜炎。
- 【用法用量】： 一般狀況下，一天3~4次，一次1~2滴。在發作期間可2小時滴一次，一次2滴。
本藥須由醫師處方使用。

- 【禁忌】： 本品之禁忌症是急性單純性疱疹、牛痘、眼睛感染性結核損傷及大部份角膜病變疾病之早期急性階段。禁用於細菌和病毒的感染。已知對其任何成份有過敏的患者，禁止使用。
- 【注意事項】： 如使用本品而沒有立即的臨床效果時，需研究是否有其他併發症。長期使用局部類固醇可能造成眼內壓升高和白內障。若使用本品二星期以上，最好能做眼壓測定和裂隙鏡檢查。當青光眼患者使用局部腎上腺皮質類固醇時，需檢查眼壓。如眼壓過高，需停止治療。在造成角膜變薄的疾病中，使用局部性類固醇時，曾經發生穿孔現象，長期使用局部性抗生素可能造成包括細菌在內的無感受性微生物的過度繁殖。如產生此種情形，或對本製劑的任一成份有刺激或過敏發生，應即停藥，並尋找正常的治療。懷孕期間使用局部性腎上腺皮質類固醇製劑的安全性尚未確知。
- 【副作用】： 增加眼壓、眼睛過於敏感而明顯的增加刺激而引起充血和浮腫的感覺。

【包裝】： 100公撮以下塑膠瓶裝。

製造廠：美西製藥有限公司
高雄市仁武區工業一路9號
委託者：榮山藥品股份有限公司
高雄市三民區重慶街116號

