治關能膜衣錠
Jikorin F.C. Tablets

衛署藥製字第 044316 號
非類固醇、非比林系類之消炎、鎮痛劑

1. **使用本藥會增加發生嚴重心血管栓塞之機率，包括心肌梗塞和中風，且嚴重的話可能會致命。上述症狀可能發生在使用此藥品的早期階段，且使用的時間越長，機率越大。**
2. **進行冠狀動脈繞道手術之後 14 天內禁用本藥。**

【成分】

有效成分及含量：每膜衣錠含 Ibuprofen.....200mg

其他成分(賦形劑)：Aerosil、Corn Starch、Prejel 97、Sodium Saccharin、Stearic Acid、Corn Starch Dried、Purified Water、Methacrylic Acid Methyl Methacrylate Copolymer、Talc、Magnesium Stearate、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、PEG 6000、Ethanol。

【用途(適應症)】：慢性關節風濕症、關節痛、關節炎、神經痛、神經炎、背腰痛、上氣道炎之消炎、鎮痛。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人。
3. 嚴重出血傾向。(包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便)。
4. 嚴重肝衰竭。
5. 嚴重腎衰竭。
6. 服用阿斯匹林(aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人。
7. 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內。

- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 未滿12歲，65 歲以上。
2. 孕婦、計畫懷孕或可能懷孕婦女及哺乳婦。
3. 曾有消化性潰瘍的人。
4. 有凝血功能異常或曾有相關病史的人。
5. 有肝臟疾病或曾有相關病史的人。
6. 有心臟疾病(例如心肌梗塞、心臟衰竭)或曾有相關病史的人。
7. 曾有藥物過敏的人。
8. 支氣管氣喘的人。

- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 正在使用任何藥品。
2. 高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸的人。
3. 時常飲用酒精性飲料的人。

- 其他使用上注意事項

1. 服用本藥只能緩解症狀，無法治療病因。
2. 勿超過建議之使用量，若不慎服用過量，應立即停藥就醫，並攜帶外盒包裝以出示醫師參考。

3. 本藥未經醫師處方或指示，不得長期服用。
4. 若經醫師處方長期服用本藥，應定期回診進行臨床檢查。
5. 酒精警語：不得與酒精性飲料併用，可能造成胃出血。

【用法用量】

成人	每次 2 錠，每 4~6 小時服用一次。
兒童	1 天 20mg/kg 分服。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

皮膚	皮膚癢、起疹子
消化系統	胃部(肚臍上方)不舒服、腸胃脹氣、便秘、拉肚子
精神及神經系統	抑鬱
其他	頭痛、頭暈

二、使用本藥後，若發生下列副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治。

1 已使用本藥用來退燒超過 3 天或用來止痛超過 5 天，症狀未緩解或更惡化時。

2 有下列症狀：

身體部位	副作用
血液	發生不良性貧血(可能症狀：出血、傷口出血不止、容易感染、發燒、寒顫)、顆粒性白血球缺乏(可能症狀：容易感染、發燒、寒顫)、血小板減少(可能症狀：出血、傷口出血不止)
過敏症	史蒂文生氏－強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(可能症狀：皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔潰爛；喉嚨痛；眼睛紅腫、灼熱；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹；發燒)、氣喘(可能症狀：呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、呼吸困難)
眼睛	視覺異常
耳朵	重聽、耳鳴
肝臟	黃疸(眼白變黃)、肝功能指數GOT/GPT/(AST/ALT)異常
消化系統	胃痛或有灼熱感、血便
口腔	口內炎(口腔潰瘍或發炎)
心臟血管系統	心臟衰竭與水腫(可能症狀：疲倦、心跳加速、呼吸困難、浮腫)、心肌梗塞(可能症狀：胸部隱約疼痛、胸悶、呼吸不順暢)、低血壓(可能症狀：暈厥)
其他	體溫過度下降、四肢冰冷

【包裝】：8~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存條件】：置於緊密容器內保存，儲存於 25℃以下。

總 代 理：賜利優醫藥生技有限公司
地　　址：彰化縣彰化市復興里力行路 116 號 1 樓
藥商、製造廠：井田國際醫藥廠股份有限公司
地　　址：台中市大甲區幼獅工業區幼獅路 32 號