PIC/S.G.M.P優良藥品

治關能 膜衣錠

Jikorin F.C. Tablets



Jikorin F.C. Tablets

治關能 膜衣錠

慢性關節風濕症、關節痛、關節炎
神經痛、神經炎、背腰痛
上氣道炎之消炎、鎮痛

90錠

總 代 理：腸利優醫藥生技有限公司
地　　址：彰化市力行路116號1樓
藥商、製造廠：井田國際醫藥廠股份有限公司
地　　址：台中市大甲區幼獅工業區幼獅路32號
衛署藥製字第044316號

EXP:
LOT:

4 712771 781076

PIC/S.G.M.P優良藥品

治關能 膜衣錠

Jikorin F.C. Tablets



Jikorin F.C. Tablets

治關能 膜衣錠

慢性關節風濕症、關節痛、關節炎
神經痛、神經炎、背腰痛
上氣道炎之消炎、鎮痛

90錠

【有效成分及含量】每膜衣錠含Ibuprofen 200mg

【其他成分(賦形劑)】Aerosil、Corn Starch、Prejel 97、Sodium Saccharin、Stearic Acid、Corn Starch Dried、Purified Water、Methacrylic Acid Methyl Methacrylate Copolymer、Talc、Magnesium Stearate、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、PEG 6000、Ethanol。

【用途(適應症)】慢性關節風濕症、關節痛、關節炎、神經痛、神經炎、背腰痛、上氣道炎之消炎、鎮痛

【不得使用族群】曾因本藥成分引起過敏的人；目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人；嚴重出血傾向(包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便)；嚴重肝衰竭；嚴重腎衰竭；服用阿斯匹林(aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人；進行冠狀動脈繞道手術之後14天內。

【用法用量】

成人	每次2錠，每4~6小時服用一次
兒童	1天20mg/kg分服

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【諮詢專線】(06)3035595　0800-618123

【經銷商】桐瑛生技事業股份有限公司

【地　址】台南市永康區中華路425號14樓之1