4 717216 120175

Jikorin F.C. Tablets

PIC/S G.M.P.

治關能 膜衣錠


Jikorin F.C. Tablets

IBUPROFEN

消炎·鎮痛

PIC/S G.M.P.

緩解各種
疼痛症狀



20錠

本廠通過 PIC/S GMP 規範
衛署藥廠證字第(AP)0428050號

小型錠劑 容易吞服

PIC/S G.M.P.

治關能 膜衣錠

井田
帶您發現微笑的秘密

PIC/S G.M.P.

Jikorin F.C. Tablets

治關能 IBUPROFEN 膜衣錠
Jikorin F.C. Tablets

PIC/S G.M.P.認證&國際ISO9001驗證 & 中日合作廠
製造廠：井田國際醫藥廠股份有限公司
CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.
台灣台中市大甲區幼獅工業區幼獅路32號

衛署藥製字第 044316 號

品名：治關能膜衣錠
有效成分及含量：每膜衣錠含 Ibuprofen_200mg
其他成分（賦形劑）：Colloidal Silicon Dioxde、Corn Starch、Prejel 97、Sodium Saccharin、Stearic Acid、Corn Starch Dried、Purified Water、Methacrylic Acid Methyl Methacrylate Copolymer、Talc、Magnesium Stearate、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、PEG 6000、Ethanol。
適應症：慢性關節風濕症、關節痛、關節炎、神經痛、神經炎、背腰痛、上氣道炎之消炎、鎮痛。

不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人；目前有消化性潰傷、出血或穿孔的人。曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰傷或出血病史的人；嚴重出血傾向(包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便)；嚴重肝衰竭；嚴重腎衰竭；服用阿斯匹林(aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人；進行冠狀動脈繞道手術之後14天內。

用法用量：

成人	每次 2 錠，每 4~6 小時服用一次。
兒童	1 天 20mg/kg 分服。

類別：醫師藥師藥劑生指示藥品。
諮詢專線：0800-461461
注意事項：使用前請詳閱內附說明書。
請在有效期內使用，逾期恕不接受退換。

井田
帶您發現微笑的秘密