《用法用量》
呼吸道/皮膚和軟組織的感染：
成人：一般劑量為 250mg，每天二次，持續七天，嚴重感染時可增加至 500 毫克，每天二次，持續十四天。
大於 12 歲之孩童：用法如成人。小於 12 歲之孩童：使用小兒用懸液劑。
因幽門螺旋桿菌(H. pylori)引起潰瘍之根除：
成人：每次 500mg，每日三次，加上每天服用 Omeprazole 40mg 治療 14 天。
老人：如成人用法。
腎臟疾病：除非是特別嚴重的腎臟損害(肌酸清除率小於 30 毫升/分鐘)，否則一般不需調整劑量，如需要調整劑量，每天之總劑量應減半，例如較嚴重的感染時，用 250 毫克每天一次或每天二次。食物不影響生體可用率，可和食物一起服用。
本藥須由醫師處方使用。

製造批號：
保存期限：

"華興" 幽立息
膜衣錠 250 公絲

衛署藥製字第 044366 號(G-7489)
《成　　份》每錠含：Clarithromycin.....250mg
《適 應 症》上、下呼吸道有感受性細菌所引起之感染症。可與 Omeprazole 併用治療與幽門螺旋桿菌(H. pylori)有關之十二指腸潰瘍。
《注意事項》《副 作 用》請詳閱說明書後使用。
《儲　　存》 儲存於 25℃以下。

華興化學製藥廠股份有限公司
彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

Ulicin
F.C. Tablets 250mg "H.S."