

卡達 凝膠

GLINDA GEL

10 公絲/公克

10 mg/gm

[成份]

每公克中含有：

Clindamycin (as phosphate) 10 mg (potency)

[作用]

Clindamycin已被證實對面皰，青春痘有效，有面皰的人使用本劑四星期後，其面皰的Clindamycin濃度達到 $597\mu\text{g}/\text{gm}$ ，在體外Clindamycin對引起面皰的粉刺初油酸桿菌(*Propionibacterium acnes*)之最低抑菌濃度(MIC)僅 $4\mu\text{g}/\text{ml}$ 。使用Clindamycin後皮膚表面的游離脂肪酸由14%減少至2%。

[適應症]

尋常性痤瘡。

[用法用量]

一日2次，薄敷於患處。

本藥須由醫師處方使用

[注意事項]

- 口服或注射Clindamycin可能會有嚴重的結腸炎，局部使用也可能會從皮膚吸收而有下痢，下血痢和結腸炎(包括偽膜性結腸炎)。
- 如有因Clostridium difficile引起的偽膜性結腸炎，可用Vancomycin治療，通常是每天500mg至2gm，分3~4次服用7~10天。
- 除非由醫師處方，孕婦及授乳婦不建議自行使用本劑。
- 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

製造廠：

德周製藥股份有限公司

桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路一號

8.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

9.深部皮膚組織感染請就醫治療。

[副作用]

- 局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎、紅疹，鱗屑剝落、皮膚乾燥、脫皮、搔癢、皮膚油膩等。
- 局部使用也有可能引起革蘭氏陰性毛囊炎，腹痛，胃腸不適。
- 繼發性感染。

[警語]

- 對藥物各成分過敏者不得使用。
- 長期使用有可能引起繼發性感染。

[保存]

本藥品應包裝於緊密容器，貯存於陰涼(25°C以下)乾燥避光且兒童不易取得處所。

[包裝]

100公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。

Product Code No.714

總經銷：

宏翔藥品有限公司

台北市民權西路79號6樓之6