“亞培”盼納補 膜衣錠
PRAMET®FA

〞Abbott〞Pramet® FA Film-coated Tablets

衛署藥製字第 044883 號

【成份】每錠含：

Iron (as Ferrous sulfate)	60 mg
Nicotinamide	10 mg
Calcium (as Calcium Carbonate)	250 mg
Riboflavin	2 mg
Thiamine Mononitrate	3 mg
Pyridoxine HCl	5 mg
Calcium Pantothenate	1 mg
Ascorbic Acid	100 mg
Iodine (as Calcium Iodate)	100 mcg
Copper (as Cupric Chloride)	150 mcg
Folic Acid	1 mg
Vitamin B_{12}	3 mcg
Vitamin A	4000I.U.
Vitamin D_3	400I.U.

【適應症】維生素及礦物質缺乏之補充

【用法用量】成人每日一錠。醫師藥師藥劑生指示藥品

【警告】 維他命 B_{12} 缺乏時，單獨使用葉酸來治療惡性貧血及其他的巨母紅血球貧血是不恰當的。

【注意】 葉酸可能會遮掩惡性貧血的存在，在血液方面可能會獲得緩解，但神經方面的改變仍繼續在進行

【注意事項】1.須置於小孩接觸不到之處。
2.須避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
4.三個月以下嬰兒不宜使用。

【副作用】口服或注射葉酸曾有發生過敏反應的報告。

【劑量超過】急性鐵劑過多可能會引起噁心、嘔吐；嚴重時甚至可能引起心臟血管衰竭及死亡。口服元素鐵的推測致死劑量是每公斤體重 300 毫克。血中鐵及總鐵結合容量，可當作使用螯合劑 (如 deferoxamine) 的指標。

【賦形劑】Methylmethacrylate-Methylacrylate copolymer, Magnesium stearate , Povidone K30, Polyethylene glycol 8000, Corn Starch, Starch Pregelatinized, Cellulose Microcrystalline PH 102, Opadry Blue OY-B-20924, Opadry Clear OY-S-29038, Talc, Titanium Dioxide USP, Dehydrated Alcohol, Alcohol 95%, Acetone, Water Purified

【包裝】2~1000 錠塑膠瓶裝。

【儲存】請置於 25°C 以下乾燥處。

委託製造者：美商亞培股份有限公司台灣分公司
台北市民生東路三段 51 號 6 樓

製　造　廠：健亞生物科技股份有限公司
新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號