



華興製藥

## “華興” 弔喘平 錠 25 微公克

*Mixapin Tablets 25mcg "H.S."*

衛署藥製字第 045489 號(G-7922)

### 《簡介》

本品屬於支氣管擴張劑，微量即能發揮支氣管擴張作用，作用迅速且持續時間長，對氣管平滑肌  $\beta$  2-受容體選擇性高，抗過敏作用強，對心血管系影響輕微，耐受性良好，被認為是理想的治療劑。

### 《成份》

每錠含：Procaterol Hydrochloride Hemihydrate.....25mcg

### 《賦形劑》

Lactose、Starch、Povidone K-30、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate。

### 《藥理特性》

1. 支氣管擴張作用：本品與 Isoproterenol 有同等支氣管擴張作用，但較 Salbutamol 強。
2. 支氣管擴張作用時間持續長久，較 Isoproterenol 及 Salbutamol 長。
3.  $\beta$  2-感受體選擇性高，對心血管系無不良影響。
4. 抗過敏作用：本品對誘發氣喘的游離組織胺(Histamine)有強力抑制作用。
5. 對氣管之分泌作用：本品促進氣管內纖毛運動亢進作用，而顯著的影響氣管分泌作用。

### 《適應症》

支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸患者之氣道閉塞性障礙。

### 《用法用量》

通常成人 1 日 1 回，1 回 2 錠，於就寢前服用，或早晨、就寢前各服 1 錠。

6 歲以上的兒童，1 日 1 回，1 回 1 錠，就寢前服用，或早晨、就寢前各服 1 錠，得依年齡、症狀適宜的增減。

本藥須由醫師處方使用。

### 《副作用》

偶有心悸、震顫、頭痛、目眩、失眠、耳鳴、噁心、皮疹、口渴、鼻塞等之不良反應。

### 《注意事項》

1. 請依正確方法及劑量服用，效果不彰時請考慮中止投與。
2. 連續過量使用，可能會發生不整脈，嚴重者引起心跳停止，請勿過量服用。
3. 下列患者請慎重投與：甲狀腺機能亢進、高血壓、心疾患及糖尿病。
4. 妊娠中投與的安全性仍未確立，孕婦或可能懷孕之婦女之使用除非認定治療之益處勝過危險性方可投予。
5. 本品會抑制 allergen(過敏原)引起之皮膚反應，欲施行皮膚試驗時，須在 12 小時前停藥。
6. 本劑與 Epinephrine 及 Isoproterenol 等之 Catecholamine 併用時，可能引起不整脈、更會導致心跳停止，應避免使用。

### 《包裝》

4~1000 粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

本品代號：Mixapin 208

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6