

鈣離子拮抗劑

“南光”能得爽 紓緩膠囊 90 毫克
120 毫克 (鹽酸迪太贊)

Nakasser SR Capsules 90 mg
120 mg "N.K." (Diltiazem HCl)

本品為Benzothiazepine衍生物，它是一種鈣離子阻斷劑。這類藥物在降血壓作用時，會抑制鈣離子的流動，如此可使血管平滑肌擴張，產生末梢阻力降低的作用。在抗狹心症的效果，抑制造成冠狀血管及末梢血管收縮的鈣離子流通，Diltiazem經由擴張冠狀血管及減低心跳速率，而能增加心臟的血流及氧氣，以及降低後負荷(after load)及心跳速率。

本品是特殊的24小時持續釋放設計，因此一天服用一次，其與普通膠囊一天服用三次的效果比較，本品具有幾乎相同的生體可用率及更穩定的血中濃度且可以減少服用次數。

□藥品動力學：

1. 本品能迅速被胃腸道吸收，吸收的程度80~90%，而在6~11小時到達最高血中濃度。
2. 絶對生體可用率約40~67%
3. 血漿蛋白結合率約70~80%。
4. 本品的代謝半衰期約5~7小時。
5. 本品大多數經由糞便排出體外，少數經由尿液。

□成 分：Each SR capsule contains:

90 mg: Diltiazem Hydrochloride 90 mg
120 mg: Diltiazem Hydrochloride 120 mg
90 mg:
賦形劑 : Sugar Seed (25-30 mesh)、Eudragit RS-PO、Dibutyl Phthalate、Magnesium Stearate、Talc、Eudragit E100、Povidone。
膠囊殼 : Pharmaceutical Gelatin、Titanium Dioxide。

120 mg:

賦形劑 : Sugar Spheres、Povidone、Talc、Hydroxypropyl Methylcellulose、Polyethylene Glycol、Ethyl Cellulose、Eudragit E100、Dibutyl Phthalate、Magnesium Stearate。

膠囊殼 : Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Water Purified。

□適應症：高血壓。

□用法用量：本藥須由醫師處方使用。

口服投與，請勿咀嚼，本藥為緩釋膠囊，不可剝開使用。

成人劑量 -

每天一次90mg，必要時，可視個人的反應逐漸增加至每天一次360mg。

年長者及肝腎受損者劑量 -



初劑量每天一次90 ~ 120mg，且必須測量其心跳速度，當其心跳降至每分鐘50次以下時，即不可再增加劑量。

□ 注意事項：

1. 有下列病情的患者禁止服用本品：
病竇症候群(Sick sinus syndrome)、中至重度房室傳導阻斷(AV block)、嚴重低血壓(收縮壓小於90mmHg)、急性心肌梗塞或肺充血。
2. 有輕度低血壓、心收縮不全(Asystole)、輕度心跳徐緩或P-R間期(PR-interval)過長、以及肝功能損害之患者，都應慎重投與。
3. 對於孕婦或可能懷孕之婦女，本品為Category C，可能會對胎兒造成危險，因此除非必要否則避免使用。
4. 因本品會分泌到母乳，故授乳婦須慎重投與。
5. 治療高血壓時，必須定期檢查患者之血壓。

□ 警語：

本藥品含DBP(Dibutyl phthalate)，經動物試驗顯示DBP於高劑量下對於生殖器官的發育產生不良反應。建議懷孕婦女及哺乳期婦女僅在絕對必要的情況下，才服用含DBP的藥品。

□ 副作用：

一般而言，Diltiazem類產品很少有副作用，即使有副作用，也是輕微的。曾有報告證明其副作用如：腳踝水腫、頭痛、眩暈、疲倦感、臉紅、噁心、便祕、發疹、蕁麻疹、一級房室傳導阻斷(AV block)、心跳徐緩、異常的ECG、氨基酸移轉(SGOT、SGPT)增加。

□ 交互作用：

Diltiazem會和交感神經乙型阻斷劑(Beta blockers)，Fentanyl、Cyclosporine、Carbamazepine、Digitalis glycosides、Cimetidine、Encainide等會產生交互作用。

□ 儲藏：本品應於25°C以下避光貯之。

□ 包裝：2~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

90mg：衛署藥製字第046439號 G.M.P.:G-8356

120mg：衛署藥製字第045926號 G.M.P.:G-8142



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845