

【仿單】

芙美爽 乳膏 1 毫克/公克

Fumesone Cream 1mg/gm

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 046540 號

【成分】 每公克含有：

Mometasone furoate 1.0 mg

賦形劑：

Paraffin Wax、Glyceryl Stearate And PEG-100 Stearate、Cetostearyl Alcohol、Span 60、Polysorbate 80、Menthol Oil、Chlorocresol、Propylparaben、Sodium Phosphate Monobasic、Phosphoric Acid、Propylene Glycol、Methylparaben、Menthol、Alcohol 95%、Purified Water

【適應症】 對類固醇具有感受之皮膚所引起之炎性反應及搔癢之緩解。

【用法用量】 一日一次，薄敷於患處。

【副作用】 局部感覺異常，癢或皮膚萎縮，但極少發生。

【副作用】 禁用於對本品中之任一成份過敏的病人。

【注意事項】 如有刺激、過敏發生應停用本品，並施予適當治療。如患處有明顯的感染發生，可併用抗生素如抗真菌劑，如果情況未見好轉，則應停用本劑，直至感染被控制住方可再用。其他如全身性類固醇易引起的副作用偶爾也會發生，如腎上腺抑制。廣體、密閉式治療容易引起全身性吸收。所以在長期使用本劑時，尤其嬰幼兒，需特別小心。本品不可作為眼用。兒童局部使用類固醇比成人病患易導致下視丘-腦下垂體軸功能抑制及 Cushing syndrome，因為體表面積/體重的比率較大。兒童局部使用類固醇必須限制在最小的有效治療範圍，長期的類固醇治療可能會干擾兒童的生長。

【懷孕或哺乳婦女】 本品對胎兒及哺乳婦女安全性未知，因此在對母體的有益性大於對胎兒的危險性時才可使用，請務必小心，不得大量或長期使用。局部使用類固醇而全身性吸收，尚不知是否會分泌在乳汁中，全身性的使用類固醇會分泌乳汁中，要估計此藥對母親的重要性，再決定停止哺乳或停藥。

【懷孕或哺乳婦女】 出現症狀：過量長期使用會抑制下視丘-腦下垂體軸功能，引起腎上腺功能抑制。治療方法：可給予適當的交感神經素治療。急性皮質類固醇過多乃可逆反應。如有需要，可作適當處理來治療電解質不平衡。如果為慢性中毒，以漸進式中止類固醇治療。

【保存方式】 請貯存於 25°C 以下，且於期限內使用。

【包裝】 1000 公克以下鋁軟管裝及塑膠瓶裝。

LTON018

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號