衛格止痛加強錠

Welger Extra-Strength Pain Relief Caplets

鎮痛解熱劑，解除擾人的疼痛

【成　分】每錠含有：

【有效成分及含量】**Acetaminophen 500mg、Caffeine Anhydrous 65mg。**

【其他成分（賦形劑）】Avicel®PH102、Lactose、Povidone K-30 Polyplasdone® XL-10、Stearic acid、Primojel、Starch、Povidone。

【用途（適應症）】

退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

(一) 12歲以下。

(二) 有肝臟疾病的人。

(三) 成人連續服藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

(四) 若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為Acetaminophen可能造成肝損害。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

(五) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

(六) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

成人及12歲以上	發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複使用，每次1錠。每24小時內不可超過4次。

【警　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化系統	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 服用本類製劑三天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

(三) 服用過量【Acetaminophen 每日超過4,000毫克(mg)】，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

(四) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【作　用】

衛格止痛加強錠能解除各種疼痛，亦可用於發燒症狀的不適感解除，為一解熱鎮痛劑，其效果與阿斯匹靈（Aspirin）相當，但卻不像阿斯匹靈藥品會導致腸胃等副作用。含咖啡因(Caffeine），可溫和刺激中樞神經具有提神效果，常與Acetaminophen合併使用，當作頭痛治療劑。

【類　別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包　裝】8-1000錠鋁箔盒裝。

【儲　存】儲存於25℃以下。

衛署藥製字第 G-8750 047373號

新萬仁化學製藥股份有限公司
Hsin Wan Jen Chem.&Pharm.Co.,Ltd.
台中市豐原區文賢街158號