尺寸：130mm*190mm

衛署藥製字第047611號
GMP-G-8881

舒 伯 痔 栓劑

SUBODYL Suppositories

【成　　份】每個栓劑含：Polycresolsulfonate　100.0 mg
Cinchocaine HCl (Dibucaine HCl)　2.5 mg

【適 應 症】痔瘡及肛門直腸裂隙和破裂所引起之疼痛、出血、搔癢及發炎。

【禁　　忌】* 對CINCHOCAINE過敏者不可使用。
* 懷孕期必須估算出對母體及胎兒的全部可能危險。在絕對需要時才可使用。
* 動物試驗沒有發現任何畸形胎形成使用於懷孕婦女所可能的危險研究報告尚未提出，仍未知道主成份是否會存在哺乳母親的乳汁中。

【副 作 用】在開始治療時偶有極輕微的局部不適，如：癢、燒灼感。但通常能迅速消退，不須停藥。

【用法用量】每天2-3次，每次一個，於排便後塞入。症狀消除後，可改為每天一個栓劑。

【類　　別】本藥須由醫師處方使用。

【注　　意】貯存於25℃以下。
注意包裝上的有效期限。
栓劑可能會變色及包裝可能會破損，但不會影響產品有效性。
貯存時必須小心，勿讓兒童觸及。

【包　　裝】100顆以下盒裝。

【賦 形 劑】Hard fat 、Lecithin Hydrogenated、Silicon Dioxide、Sodium Hydroxide、Purified Water

委託者:
育新企業有限公司
桃園市龜山區文三一街37號1樓

製造廠:
明德製藥股份有限公司
桃園市楊梅區民富路二段360號

MADE IN TAIWAN