

6枚入  
(10cmx14cm)  
建議售價：180元

經衛生福利部核定為PIC/S GMP優良藥品貼布劑

外用 **消炎鎮痛** 水性藥布

**伸縮** **冷感** **舒適**

Indomethacin

得生

順好貼

藥布

Sung Hao Tieh Pap "T.S" (吶哞美酒辛)



將藥溶於水製成貼布劑  
經由表皮吸收而確實鎮痛消炎



委託者：凱進藥品有限公司

製造廠：得生製藥股份有限公司二廠

得生 順好貼藥布 (吶哞美酒辛)  
衛署藥製字第047720 G-8959號

本品適用於變形性關節症、肩關節周圍炎、腱、腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨關節炎、肌肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀的緩解。

■成分：

有效成分及含量：Each piece 14.0g (10cmx14cm)(膏體重)中含有：  
Indomethacin.....85mg

其他成分(賦形劑)：

Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sodium Polyacrylate, Sorbitol Solution, Nikasol TS-620, Kaolin, Carboxymethylcellulose Sodium, L-Menthol, Sodium Polyacrylate Starch, Alcohol, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Isopropyl Myristate, N-Methyl-2-Pyrrolidone, Tartaric Acid, Aerosil 200

■用途(適應症)：暫時緩解局部疼痛。

■不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人(包含主成分以及賦形劑成分)。

■用法用量：

依患部情況給予適當增減使用，次數通常一日1次貼於患部，慢性疾患可一日換貼2-3次，切割成適當大小，剝去表面薄紙貼於患部。  
流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。  
於關節等易脫落之部位，可用粘著性膠帶或伸縮繃帶固定。

■類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

■諮詢專線：0800000658



委託者：凱進藥品有限公司  
住 址：高雄市鳳山區新康街237巷4號1樓  
製造廠：得生製藥股份有限公司二廠  
住 址：台南市永康區環工路42-1號

■使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用：
  - 曾因本藥成分引起過敏的人(包含主成分以及賦形劑成分)。
- 有下列情形者，請洽醫師診治：
  - 12歲以下。
  - 深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生：
  - 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - 曾對其他藥品或化妝品有過敏症狀(皮膚起疹子、紅斑、搔癢等)。
- 其他使用上注意事項：
  - 使用本藥品後，應徹底清洗雙手後再戴隱形眼鏡。
  - 兒童(12歲以下)必須在成人協助下使用。
  - 請勿用於：眼睛四周，有黏膜的地方(如眼睛、生殖道)、出現紅疹或有搔癢的地方、傷口處。
  - 本藥品避免使用在大面積(大於使用者兩個手掌的面積)或皮膚深層感染的地方。
  - 本藥品不可使用超過2個星期。
  - 本藥品必須置於兒童(12歲以下)拿不到的地方。
  - 避免陽光直射，保存在室內陰涼乾燥的地方。
  - 為了確保品質，未使用之貼片應置於袋內，並將拉鍊密閉。
  - 本藥品可能隱蔽細菌感染之病徵。

■警語

1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師或藥師。

部位	症狀
皮膚	偶有搔癢、灼熱感、局部發紅

- 2.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
  - 若有任何不適情況產生。
  - 使用後自己覺得沒有改善或是更嚴重。
  - 發生視覺問題(視力模糊、視力減退)或白血球減少症(出現症狀：發燒、喉嚨痛)或血小板減少症(出現症狀：出血，包括牙齦流血，皮膚有紫斑或點狀紅斑，大便有血或解黑便)或顆粒性白血球缺乏病(出現症狀：發燒、喉嚨痛)或青腸出血(血便)或尿血症(尿液中有血(絲))。

■包裝：14.0g(10cmx14cm)(膏體重)x(1-10)片/鋁箔袋裝

■儲存條件：儲存於30℃以下。

批 號：

保存期限：



開封後，請速將拉鍊密閉。

請由此剪開

得生

# 順好貼藥布


(吶哚美酒辛)

## Sung Hao Tieh Pap "T.S"

### 外用 消炎鎮痛 水性藥布

# Indomethacin

建議售價:180元



6枚入  
(10cmx14cm)

## 伸縮 冷感 舒適



將藥溶於水製成貼布劑  
經由表皮吸收而確實鎮痛消炎

經衛生福利部核定為PIC/S GMP優良藥品貼布劑 衛署藥製字第047720 G-8959號



得生

# 順好貼藥布

(吶哚美酒辛)

衛署藥製字第047720 G-8959號

本品適用於變形性關節症、肩關節周圍炎、腱、腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨關節炎、肌肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀的緩解。

#### ■成分：

有效成分及含量：Each piece 14.0g(10cmx14cm)(膏體重)中含有：  
Indomethacin.....85mg

其它成分（賦形劑）

Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sodium Polyacrylate, Sorbitol Solution, Nikasol TS-620, Kaolin, Carboxymethylcellulose Sodium, L-Menthol, Sodium Polyacrylate Starch, Alcohol, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Isopropyl Myristate, N-Methyl-2 Pyrrolidone, Tartaric Acid, Aerosil 200

■用途（適應症）：暫時緩解局部疼痛。

■不得使用族群：曾因本藥成分引起過敏的人（包含主成分以及賦形劑成份）。

■用法用量：

依患部情況給予適當增減使用，次數通常一日1次貼於患部，慢性疾患可一日換貼2~3次，切割成適當大小，剝去表面薄紙貼於患部。

流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。

於關節等易脫落之部位，可用粘著性膠帶或伸縮繃帶固定。

■類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

■類別：0800000658



委託者：凱進藥品有限公司

住 址：高雄市鳳山區新康街237巷4號1樓

製造廠：得生製藥股份有限公司二廠

住 址：台南市永康區環工路42-1號

#### ■使用上注意事項

1.有下列情形者請勿使用：

●曾因本藥成分引起過敏的人（包含主成分以及賦形劑成份）。

2.有下列情形者，請洽醫師診治：

●12歲以下。

●深部皮膚組織感染。

3.有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生：

●孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

●曾對其他藥品或化妝品有過敏症狀（皮膚起疹子、紅斑、搔癢等）。

4.其他使用上注意事項：

●使用本藥品後，應該徹底清洗雙手後再戴隱形眼鏡。

●兒童（12歲以下）必須在成人的協助下使用。

●請勿用於：眼睛四周，有黏膜的地方（如眼睛、生殖道）、出現紅疹或有搔癢的地方、傷口處。

●本藥品避免使用在大面積（大於使用者兩個手掌的面積）或皮膚深層感染的地方。

●本藥品不可使用超過2個星期。

●本藥品必須置於兒童（12歲以下）拿不到的地方。

●避免陽光直射，保存在室內陰涼乾燥的地方。

●為了確保品質，未使用之貼片應置於袋內，並將拉鍊密閉。

●本藥品可能隱蔽細菌感染之病竈。

#### ■警語

1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師或藥師。

部位	症狀
皮膚	偶有搔癢、灼熱感、局部發紅

2.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。

●若有任何不適情況發生。

●使用後自己覺得沒有改善或是更嚴重。

●發生視覺問題（視力模糊、視力減退）或白血球減少症（出現症狀：發燒、喉嚨痛）

或血小板減少症（出現症狀：出血，包括牙齦流血，皮膚有紫斑或點狀紅斑，

大便有血或解黑便）或顆粒性白血球缺乏病（出現症狀：發燒、喉嚨痛）或胃腸

出血（血便）或尿血症（尿液中有血（絲））。

■包裝：14.0g(10cmx14cm)(膏體重)x(1-10)片/鋁箔袋裝

■儲存條件：儲存於30°C以下。

批 號：

詳見產品包裝標示

保存期限：

請由此剪開

開封後，請速將拉鍊密閉。

