署給證號碼	衛署藥製 字 第 048085 號

GMP 藥品

衛署藥製字第 048085G-9173 號

“派 頓”皮 特 康 乳膏

Patroncort Cream“Patron”

【成分】:

有效成分及含量：Fluocinolone acetonide 0.25mg/gm

其他成分(賦形劑)：Stearic acid、Cetanol、Liquid Paraffin、Isopropyl Myristate、Polyethylene Sobritan Monostearare、Sobritan Monostearare、Propyl Paraben、Methyl Paraben、Propylene Glycol、Silicon KS 66、Purified Water。

【用途(適應症)】：濕疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】:

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

(一)深部皮膚組織感染

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)兒童、孕婦及授乳婦。

(二)本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。

(三)本藥勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

(四)使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。

(五)類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。

四、其他使用上注意事項：

(一)須置於小孩接觸不到之處。

(二)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

(三)勿超過建議使用量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

(四)塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

(五)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

(六)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

(七)臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

(八)皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

[用法用量]：

關係部位	塗擦方式
患部	塗於患部

【警　語】:

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。

全身性：庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：自覺狀況未改善或更惡化。

【類　別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包　裝】：1000 公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

【儲　存】：儲存於 25℃以下。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨東路 50 號 TEL：07-6216126