補件用

諾特感冒熱飲顆粒

NOTER COLD & FLU GRANULES

感冒大都由病毒感染上呼吸道而引起流鼻水、鼻塞、打噴嚏、發冷、高燒、咽喉痛、頭痛、關節痛、肌肉酸痛等。諾特感冒熱飲無藥味。用水沖泡後，溫熱的喝，能幫助發汗，舒解感冒及受風寒時引起的症狀。諾特感冒熱飲不含阿斯匹靈，不傷腸胃。

【成分】

有效成分及含量

每公克中含量

Acetaminophen…… **100mg**

Phenylephrine Hydrochloride…… **1.66mg**

其他成分(賦形劑)

Hydroxypropylmethylcellulose、Stearic Acid、Citric Acid Anhydrous、Sodium Citrate Anhydrous、Acesulfame Potassium、Silicon Dioxide、Lemon Powder、Sugar、Raspberry Powder、Blueberry Powder

【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(鼻塞、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

(二)服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)6歲以下。

(二)有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。

(三)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。

(四)曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

(三)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議劑使用量。

(四)不要服用本藥超過七日。

(五)服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

(六)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

【用法用量】

將一包諾特感冒熱飲倒入一般杯子或馬克杯中。慢慢加入半杯溫開水，攪拌均勻後，再依個人喜好加入冷水或溫水至約150c.c，一般紙杯的八分滿。

12歲以上	每次一包(5g)，一日3至4次。
9歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2。
6歲以上未滿9歲	適用成人劑量之1/3。
6歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。

(三)症狀沒有改善、或症狀還伴隨有發燒、或發燒持續三日。

(四)喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

(五)服用過量〔每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

(六)有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】：6-200包鋁箔袋盒裝(每包5公克)。

保存方式：25℃，密封儲存。

醫師藥師藥劑生指示藥品

合誠化學製藥股份有限公司　桃園市平鎮區工業十路15號

衛署藥製字第　G-9484 048563　號　免費服務電話：0800-251-197