105 mm

170 mm

CHI SHENG

濟生四號

CHI SHENG No.4 Injection

濟生四號(CHI SHENG No. 4)係－含有適量的各種細胞內外液電解質及基礎營養的補充液，主要使用於治療各種病患水份及電解質之失調狀況，用於治療輕度的低張性脫水症或糖尿病性酸血症。

其特點如下　使用醋酸鹽而非乳酸鹽。由於其大部份係經由肌肉代謝成重碳酸鹽及熱量，因此較不會增加肝臟負荷。

含有磷酸鹽，主要是增加尿液之磷酸鹽濃度，而加強尿液之氫離子之排泄或磷酸之補給，磷酸鹽並可增強腎臟之緩衝作用，可改善紅血球中之糖代謝。對體力之恢復較適合。

成　　分　Each ml Contains:

主 成 分　Sodium Chloride…… 5.96mg　Monobasic Potassium Phosphate 1.64mg

Potassium Acetate…… 0.79mg　Glucose Monohydrate…… 8.80mg

Sodium Acetate $3H_2O$ .. 1.10mg

mEq/L:

Na^+ …… 110　CH_3COO^- …… 16

K^+ …… 20　$H_2PO_4^-$ …… 12

Cl^- …… 102

賦 形 劑　Sodium Metabisulfite、Disodium Edetate (EDTA)、Water for injection

---

適 應 症　低張性下痢時之水份、電解質、養份之補充。

用法用量　成人通常一次500ml，行靜脈內注射。
依年齡及症狀可適宜增減之。

本藥限由醫師使用。

注意事項　有類似過敏反應時，應立即停用。

靜脈注射時應使用無菌器具。

以無菌方式注入添加物，必須完全混合才可使用。

藥液若非澄清時，請勿使用。

毋與含鈣製劑併用，本品與鈣離子會產生沉澱。

取用時：

①運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

②本品為無色～微黃色澄明液。若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

輸液套選用及插入法：

①請依輸液套使用方法正確使用。

②請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Cor ing)產生碎片。

③使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

包　　裝　250ml、500ml、1000ml PVC塑膠軟袋及250ml、500ml、1000 ml塑膠瓶裝

儲存條件:25°C以下。

衛署藥製字第048896號

3079-02

CHI SHENG 濟生化學製藥廠股份有限公司
CHI SHENG CHEMICAL CORPORATION
新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 3 號