

溫感
舒適

鎮痛·消炎巴佈劑

溫賀喜布

高含水性基劑

6枚入

·特點：

1. 溫賀喜布 (WIN HE SIP) 是外用皮膚貼布劑，能促進皮膚、筋骨之消炎及鎮痛效果，且具溫熱感之貼布劑。
2. 溫賀喜布 (WIN HE SIP) 採用高含水性基劑，促使用效成分 DL-Camphor, Methyl Salicylate, DL- α -Tocopherol Acetate 易釋出，再配合 Capsicum Extract 具有促進血液循環之作用，經皮膚吸收後，能使患部產生溫熱感，迅速滲透至皮下組織深處，消除患部之疼痛。
3. 本品通透性佳，對皮膚刺激性較低，可以減少皮膚發癢的問題。

·成分：

有效成分及含量：Each 16g (10cmX14cm) contains:

DL-Camphor.....160mg
DL- α Tocopherol Acetate.....48mg
Methyl Salicylate.....240mg
Capsicum Extract.....48mg

其它成分 (賦形劑)：Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sorbitol Solution, Sodium Polyacrylate, Nikasol TS-620, Kaolin, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Polyacrylate Starch, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, Aerosil 200

·用途 (適應症)：暫時緩解局部疼痛。

·不得使用族群：曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。

·用法用量：

方式	1. 切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部使用。 2. 患部有濕汗或污垢時會減少膏面之粘著，貼用前請先將患部清洗並拭乾以增強粘著性及藥效。 3. 於關節等易脫落之部位，可用粘著性膠帶或伸縮繃帶固定。
次數	依患部情況給予適當增減使用，次數通常一日1~2次貼於患部，慢性疾患或疼痛嚴重者，可一日換貼2~3次。

·類別：醫師藥師藥劑生指示藥品

·諮詢專線：0800-000658

·使用上注意事項：

有下列情形者，請勿使用：

- 對本藥成分過敏者 (包含藥品成分與賦形劑成分)
- 曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。

有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- 有深部皮膚組織感染。
- 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。 · 2歲以下兒童。
- 曾對藥品或化妝品有過敏症狀 (皮膚起疹子、紅斑、搔癢等)。

其他使用上注意事項：

- 請勿用於：眼睛四周、有黏膜的地方 (如眼睛、生殖道)、出現紅疹或有搔癢的地方、傷口處。
- 嚴守使用方法。
- 兒童 (12歲以下) 必須在成人的協助下使用。
- 本藥品必須置於兒童 (12歲以下) 拿不到的地方。
- 為了確保品質，未使用之貼片應置於袋內，並將拉鍊密閉。



· 為防止兒童誤食請妥善保管。

· 避免陽光直射。 · 勿超過建議使用量或使用次數。

· 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

· 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

· 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

· 本藥勿使用於大面積之體表 (以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

· Methyl Salicylate 不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛、使用前請諮詢醫師或藥師。

· 警語：使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	皮膚灼熱感、刺痛、紅斑。
其他	水楊酸反應 (耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)、噁鼻、刺激性咳嗽。

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述之其他不適情況產生。
2. 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

· 包裝：18.0g (10cmX14cm) (含不織布、離形紙重) X1-10片鋁箔袋裝。
· 儲存條件：儲存於30°C以下。 衛署藥製字第049141 G-9880號

藥商、製造廠：得生製藥股份有限公司二廠

地址：台南市永康區環工路42-1號

經銷商：凱進藥品有限公司

批 號：

保存期限：