"汎生" 通克婷 腸溶膜衣錠

Toncatin E.F.C. tablets "Panbiotic"

衛署藥製字第 049241 號 G-9954

【成分】每錠含有：

Bisacodyl……5.0 mg

Calcium Sennosides……13.33 mg (相當於 Sennoside A&B 8.0 mg)

【賦型劑】

Corn Starch、Avicel PH 101、Polyvinylpyrrolidone K-30、Sodium Lauryl Sulfate、Sodium Starch Glycolate、Purified Water、HPMCP-55、Triethyl Citrate、Titanium Dioxide、Food Color Red No.6 1ake、Dichloromethane、Ethyl Alcohol

【適應症】緩解便秘

【用法用量】

成人及 12 歲以上 1 次 1～3 錠，一天 1 次，於睡前(或空腹時)服用。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。本品為腸溶製劑應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 爲防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼處。儲存條件：25℃以下。

3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

5. 瀉劑不應長期使用，一旦排便正常即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應盡量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

6. 商談事項

1)下列的人在服用前要和醫師、藥師、藥劑生商談

(1) 在接受醫師治療的人

(2) 孕婦或準備懷孕的人

(3) 本人或家族中有過敏體質的人

(4) 因藥物引起過敏症狀的人

(5) 有下列症狀的人：激烈腹痛、噁心、嘔吐

2)有下列情況時要馬上終止服用，拿著說明書和醫師、藥師、藥劑生商談。

(1) 服用後，有下列症狀時：

關係部位	症　　狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	激烈腹痛、噁心、嘔吐

(2) 服用一星期左右不見症狀改善時。

3)出現下痢症狀時，症狀持續或增強時，請終止服用，和醫師、藥師、藥劑生商談。

【警語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
4. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
5. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
6. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下應停止使用並請教醫師藥師或藥劑生。
7. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿三歲之嬰幼兒不得使用。
8. 禁止用於腸胃道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
9. 長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
10. 含 bisacodyl 之腸溶製劑，須整粒吞服，不得咬碎或磨粉，且使用藥前後一小時，不得使用制酸劑或牛乳。
11. Senna 類會使酸性尿成黃、棕色，鹼性尿成粉紅或紫紅色，且會使結腸黏膜變黑。
12. 本藥含 senna 類成分，若有皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

請儲存於 25℃以下陰涼處避光保存

[包裝]：2-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

臺灣汎生製藥廠股份有限公司
高雄市鳥松區大同路 5 之 1 號　電話: (07)7317861

受　託　廠：台裕化學製藥廠股份有限公司
受託廠地址：新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號