外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝”敏可治錠 5 毫克	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生福利部給證號碼	衛署藥製　　字　第　049397　號 G-10065 號		

〝杏輝〞　　PIC/S GMP 藥品

敏可治 錠 5 毫克

MEQUITAZINE Tablets 5mg 〝Sinphar〞

成份：每一錠中含有：
Mequitazine.....5mg

賦形劑：
Silicon Dioxide Micron、Microcrystalline Cellulose、Lactose SG、Iron Oxide Red、Iron Oxide Yellow、Orange Flavor Powder、Sucralose、Talc、Magnesium Stearate.

作用：
Mequitazine乃對組織胺(Histamine)中H_1-receptor具有拮抗作用之phenothiazine衍生物，其藥理作用如下：
1.具Chemical Mediator拮抗作用－具抗組織胺作用。
2.可抑制Chemical Mediator之游離。
3.具抗過敏原(Allergy)作用，對局部及全身性過敏性反應(Analphylaxis)皆有作用。
4.具Antimucarinic作用及只有輕微中樞鎮靜作用。

本劑特點：
作用持久，一天服用2次，早晚各一次即可。

適應症：
過敏性鼻炎、蕁麻疹、濕疹、藥物過敏、乾草熱、血管神經性水腫、季節性結膜炎。

用法用量：
一次5mg、早晚各服用一次。
本藥須由醫師處方使用

注意事項：依文獻記載
1.一般注意：因有催眠作用，投與中之患者在駕駛車輛或操作危險性之機械操作者應特別注意。
2.禁忌：
a)對於phenothiazine系化合物及其他類似化合物過敏者，應禁止使用本劑。
b)青光眼之患者。
c)前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾患之患者。
3.慎重投與：腎障礙患者。
4.相互作用：Barbituric acid誘導體、麻醉劑、麻醉性鎮痛劑、鎮靜劑及精神安定劑等中樞神經抑制劑、抗鬱劑、MAO(單胺氧化酶)阻害劑、若與類Atropine作用藥物併用或攝取酒精時，會增強其相互作用，應減量並慎重投與。

104.11.09

衛生福利部 食品藥物管理署 騎縫章

※ 外文仿單應檢附中文譯文

產品	有限公司
衛生 給	065 號

5.副作用：
a)過敏症：偶有發疹，光線過敏症等症狀出現，應停止用藥。
b)肝臟：很少數有出現GOT、GPT上升之現象。
c)血液：很少數有出現血小板減少現象，認定異常時，應中止用藥。
d)精神神經系：偶有嗜睡、倦怠感、頭暈，很少數有頭痛、暈眩等症狀出現。
e)消化器：偶有口渴、胃部不適，很少數有下痢、便祕、食慾不振、嘔吐、胃痛、腹痛等症狀。
f)循環器：很少數有胸部苦悶感及心悸亢進的症狀。
g)泌尿器：很少數有排尿困難之症狀。
h)其他：很少數有咽喉痛、浮腫、臉部潮紅、視調節障礙等症狀。
6.高齡者投與：臨床試驗中，高齡者的副作用有口渴發生率較高的傾向。
7.孕婦之投與：關於孕婦投與之安全性尚未確立，故孕婦及有妊娠可能之婦人勿使用。
8.小兒：對於小兒投與之安全性尚未確立(較少使用經驗)。
9.遮光室溫保存。

貯存: 儲存於30℃以下，緊密容器，避光儲存。

衛署藥製字第049397號
G-10065 號

包裝: 4～1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

PIC/S GMP
Sinphar® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN
服務專線：(0800)021053、015151 website：http：//www.sinphar.com

104.11.09

※ 外文仿單應檢附中文譯文