
【成 分】Each mL contains:
N(2)-L-alanyl-L-glutamine
.....200 mg
【適應症】
做為一般非經腸道營養須額外補充
麩胺(glutamine)的病人(如：異化過
度或新陳代謝過度之病人)氨基酸溶
液之補充品。
【類 別】本藥限由醫師使用。
【用法用量】
本藥必須與其他可相容的溶液混合
後靜脈輸注。每日劑量：1.5-2.0
毫升/公斤體重。
請詳閱說明書後使用。
【注意事項】若藥液有不澄清
、變色、異物或其他異常現
象時，請勿使用。
詳情請閱說明書。
050515-01
26301000000438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
單位：CM


100 mL
貝力多®
靜脈輸注液200毫克/毫升
Kinpomin®
for IV Infusion
200 mg/mL
南光化學製藥股份有限公司
台灣．台南市新化區中山路1001號
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
單位：CM


【儲 藏】本品請於室溫下
(攝氏15-25°C)下儲存。
衛署藥製字第049698號
G.M.P.:G-10259
4715718438002
LOT NO:1F5113
EXP DATE:20180602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
單位：CM