【說明書】

福元 四聯乳膏

濕疹 ◦ 皮膚炎 ◦ 香港腳

Four-unite Cream "F.Y."

【成分】

有效成分及含量：每公克含有：

Betamethasone (17-valerate) 0.5毫克、Gentamicin (sulfate) 1毫克(Potency)、Tolnaftate 10毫克、Iodochlorhydroxyquin 10毫克。

其他成分(賦形劑)：

Chlorocresol、Sodium Dihydrogen Phosphate、White Petrolatum、Mineral Oil Light、Kaochol 86、Propylene Glycol、Tween 60、Span 60、Cetomacrogol 1000、Paraffin Wax、Purified Water.

【用途(適應症)】

濕疹或皮膚炎、急救、預防及緩減皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

※曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

※深部皮膚組織感染。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

※兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

(五)本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。

(六)本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。

(七)使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。

(八)黴菌治療至少二星期，使用本藥須完成全程療程。

(九)配方中含有抗生素成分：

1.長期使用有可能引起繼發性感染。

2.會使衣物染色。

(十)配方中含有類固醇成分：

1.類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。

2.皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

3.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

4.臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

【用法用量】

2～3次/天，塗於患部。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。
全身性	庫欣式症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。

(三)經治療後，一般黴菌一星期、股癬和體癬二星期、足癬四星期症狀會改善，若症狀沒有改善，或症狀有改善，但停藥後病情又復發。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第049721號

【保存方式】請置於緊密容器中，貯存於25℃以下，並於期限內使用。

【包　　裝】100公克以下鋁軟管、塑膠軟管裝及塑膠瓶裝，450公克、900公克、1000公克塑膠瓶裝。

經銷商：大楨貿易有限公司
地址：新北市三重區福隆路5號2樓
服務電話：(02)8287-6566

製造廠：福元化學製藥股份有限公司
地　址：新北市瑞芳區大寮路95-1號