

普樂達注射液 Protha Injection

(Promethazine HCl) (鹽酸普美苯噻肼)

【成分】 Each ml contains:

Promethazine HCl..... 25mg
賦形劑：Sodium Chloride, Sodium Metabisulfite, Benzyl Alcohol,
Sodium Citrate, L-Cysteine HCl, Thioglycolic Acid,
Sodium Bicarbonate, Water for Injection.

【藥理作用】 依文獻記載

(1) 抗組織胺作用

預先將抗組織胺劑投藥於天竺鼠，可防止因組織胺而導致之死亡。此作用約為Diphenhydramine之30倍。

Tripeleneamine之15倍。

(2) 抗過敏作用

能強而有力地阻止土撥鼠因羊血清引起之過敏。

(3) 抗巴金森徵候(Parkinsonism)作用

抑制由實驗鼠驚駭而引起

(4) 對神經系統之作用

有抑制中樞神經作用，強化麻醉，增強催眠、鎮痛、降體溫、制吐作用，中等程度抑制副交感神經、輕度抑制交感神經作用，局部麻醉、鎮痙、降血壓作用。

【毒性】 依文獻記載

小鼠LD₅₀mg/kg：靜脈內60(52-74) 皮下240(192-300)
腹腔內142(130-154)

【適應症】 依文獻記載

震顫麻痺，巴金森徵候群，麻醉前投藥，人工(藥物)冬眠，伴有感冒等上氣道炎之噴嚏、流鼻水、咳嗽，過敏性鼻炎，枯草熱，血管運動性浮腫，伴有皮膚疾患之搔癢(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥疹、中毒疹)、蕁麻疹、動暈病。

【用法與用量】

通常成人肌肉注射1次 5-50mg (Promethazine Hydrochloride)。
單獨使用本劑時，應先用生理食鹽水稀釋注射液成 5ml，深部肌肉注射。得視年齡及症狀，適宜增減。

【本藥限醫師使用】

(註) 配伍禁忌：不宜與含鹼性、重金屬塩、或具氧化作用之藥劑配合。

【注意事項】

1. 一般注意

本劑有引起睡意作用，投藥中患者並特別注意，不得駕駛汽車或操作機械等有危險性之工作。

2. 下列患者請勿投藥

- (1) 對Phenothiazine系化合物及其類似化合物過敏之患者。
- (2) 昏睡狀態患者或正在大量使用巴比妥酸(barbiturate acid)衍生物、麻醉劑等中樞神經抑制劑之患者。

3. 副作用

- (1) 過敏症：發生過敏症狀或光線過敏時應即停藥。
- (2) 肝臟、血液：有發生肝障礙、顆粒球減少症等血液障礙之情形，應仔細觀察，如發現此等症狀，應即停藥。

(3) 精神神經系統：偶有口渴、眩暈、頭痛、視覺障礙，倦怠感等。

(4) 消化器官：偶有噁心、嘔吐等情形。

(5) 血液：偶有出現低血壓之情形。

4. 相互作用

(1) 對巴比妥酸衍生物，麻醉劑等中樞神經抑制劑，降壓劑或類似阿托品(atropine)作用之藥劑併用或飲酒時，有相互增強之作用，應慎重減量投藥。

(2) 與有抗coline作用之藥劑(phenothiazine系藥劑、三環系抗憂鬱劑等)併用時，會引起腸管麻痺(食慾不振、噁心、嘔吐、顯著便秘、腹部脹滿或弛緩及腸內物鬱滯等症狀)，繼而發生麻痺性腸塞絞痛，如出現腸管麻痺時，應即停藥。

5. 孕婦之投藥

孕婦或可能已懷孕之婦人，投與本劑時，應慎重行之。

6. 使用時注意點

(1) 肌肉注射，會引起過局部之疼痛、發紅、發燒、化膿、硬塊等。

(2) 當肌肉注射時，為了避免組織與神經等受影響，應注意下列諸點：

1) 應避免在同一部位反覆注射，對新生兒、未成熟兒、乳兒及幼兒更應特別注意。

2) 應注意避開神經分布部位：

當注射針刺入後，可能是碰到神經質患者發生劇痛時，應立刻拔出針，變更注射部位。

3) 切開安瓿時，為了避免異物混入，應使用酒精棉球等擦乾淨安瓿頭部周圍，再切斷安瓿。

(3) 注射本成分藥品時應注意血管外滲漏情形，小心避免導致注射部位周圍的組織損傷。

(4) 小於2歲的兒童不宜使用，因有呼吸抑制(呼吸緩慢)之潛在致命的風險。

(5) 大於2歲的兒童使用時，建議使用最低之有效劑量，並且避免與其他可能使呼吸抑制(呼吸緩慢)之藥品併用。

(6) 本成分藥品禁止皮下注射，可能造成嚴重組織損傷的危險。

(7) 本成分藥品最好採用深部肌肉注射，若使用其他注射方式時，尤其是靜脈注射，可能導致嚴重組織損傷，包括壞疽。

(8) 病患如注射部位感覺有任何持續性疼痛或燒灼感等不良反應時，應立即告知醫療人員。

7. 其他注意點

由於本劑之制吐作用，會使其他藥劑之中毒、腸閉塞、腦腫瘍等引起之嘔吐症狀不顯著化。

(註) 曝光時易變色，已顯著變色品不可使用。

【包裝】

1 毫升，2 毫升玻璃安瓿裝，100 支以下盒裝

【儲藏】

儲藏在溫度 15~25°C，避免日光照射。用紙盒來避免光照。



東洲化學製藥廠股份有限公司

新北市蘆洲區中山二路 195 巷 12 號

電話：(02)2281-5252 傳真：(02)22818282