●動物試驗結果顯示，即使用高劑量的Ritodrine也不會使胎兒畸形，然而由於對人體研究資料有限，所以Ritodrine不宜在懷孕的前16星期使用。

●決定使用Ritodrine治療前，應仔細小心篩選患有潛在性心臟病危機病人。

●靜脈輸注治療時，每15分鐘需注意察看一次血壓、脈搏及胎兒心跳速率。

●病人情況安定後，每1～6小時仍需檢查一次，有酸中毒情形時更應連續察看。

●為了預防由腔靜脈綜合症狀所引起的低血壓，病人施行靜脈輸注時需側臥。

●本藥品用於產科相關適應症時，須經醫師審慎評估病患使用本藥品之效益大於風險時方可使用，且應嚴密監視母親及胎兒發生心血管相關不良反應之風險，尤其是於長時間的使用下（超過48小時）。

●使用本品有發生肺水腫及心肌缺血之通報案例，應注意體液平衡及心肺功能，誘發因子包括多胎妊娠、體液超過負荷、產婦感染或子癲癇症之前兆。

●使用本品可能會伴隨心跳加快及血壓降低。應小心調整劑量，避免心跳速率每分鐘超過120次，並控制舒張壓之下降落在10-20 mmHg之間，另可請孕婦盡量維持側臥以避免腔靜脈之壓迫。

●應監控母親心肺功能，心血管相關症狀、血壓、心跳、離子及體液之平衡、血糖、血鉀和乳酸等數值，如出現肺水腫或心肌梗塞之徵兆，應停止使用本藥品並採取適當措施。

●破水或子宮頸擴張大於4公分時不建議使用本藥品。

【附記】

●如果羊膜已破裂或子宮頸已張開超出4公分，則作用微弱。

【不良反應】

大部分不良反應的發生主要與本品的藥理活性有關，大多停藥或調整劑量則可避免或回復。

◎心血管方面：

非常常見：心搏過速。

常見：心悸、舒張壓下降、低血壓。

少見：心律不整（如心房顫動）、心肌缺血、周邊血管擴張。

◎代謝方面：

常見：低血鉀。

少見：高血糖。

◎胸腔方面：肺水腫。

【交互作用】

◎鹵素麻醉劑：因有降壓之作用，可能會增強子宮收縮無力及出血之風險，因此本藥品至少停用6小時後才能使用鹵素麻醉劑。

◎皮質類固醇：皮質類固醇可能造成血糖增加或血鉀離子降低，應小心使用並監測高血糖或低血鉀之風險。

◎糖尿病用藥：本藥品可能會增加血糖，因此糖尿病患者需要時應調整糖尿病用藥之劑量。

◎鉀離子排除劑：本藥品可能有降低血中鉀離子濃度，因此使用其他可能降血鉀的藥品（如利尿劑、毛地黃、xanthine類藥品或皮質類固醇…等），避免因低血鉀增加心律不整之風險。

【立特林靜脈注射劑量表】

由下表可以找出Ritodrine所需劑量之(1)使用劑量(2)輸注速率。輸注速率可用輸注幫浦或滴速來調整。輸注液以等滲壓之葡萄糖溶液較適宜：

需要的Ritodrine 劑量 mg/minute	每500ml 輸注液所需劑量(mg)	輸注速率 drops/minute
0.15 0.25 0.35 0.40	100	15 25 35 40
20滴相當於1ml 輸注液		

【包裝】

每安瓿5毫升裝，100支以下盒裝。

【貯存】

應存放於25℃以下。

Wentin Injection 10mg/ml 衛署藥製字第049857號

(Ritodrine Hydrochloride)

GMP 藥廠

大豐製藥股份有限公司

公司·工廠：彰化市延平里岸頭巷11號