

衛署藥製字第 049932 號
G-10436 Code No. 31322

百福

眼藥膏

Biomycin Sterile Ophthalmic Ointment

【藥效】

Tobramycin是水溶性Aminoglycoside的抗生素，廣泛的對於革蘭陰性及革蘭陽性病原菌發生效力。
經過試管試驗結果證實對於下列各種微生物產生效果：
1.葡萄球菌屬：包括S. aureus和S. epidermidis(旋固酵素陽性及陰性菌，包括對Penicillin有抗性之葡萄球菌)。
2.鏈球菌屬：包括A群-beta-hemolytic，non-hemolytic族菌及肺炎球菌。
3.綠膿桿菌、大腸桿菌、肺炎桿菌、好氣性大腸桿菌、奇異變形桿菌(Indole-negative)及Indole-positive變形桿菌屬、流行性感冒嗜血菌、H. aegyptius Moraxella Lacunata Acinetobacter calcoacetus(Herella vaginacola)及某些Neisseria菌屬。
4.細菌感應試驗證實對Gentamicin有抗性的一些微生物也對Tobramycin呈現反應，目前尚未發現抵抗Tobramycin的重要性菌屬，但長期使用可能會引起抗性細菌。

【成份】

Each gm contains :
Tobramycin.....3.0 mg
賦形劑:Chlorobutanol、Liquid Petrolatum、White Petrolatum

【適應症】

眼瞼炎、淚囊炎、麥粒腫、結膜炎、角膜炎。

【用法用量】

- 輕度至中度病況：每日二至三次，每次擠約1.5公分的量於受感染之眼內。
- 嚴重病況：每三至四小時擠約1.5公分的量於受感染之眼內至明顯見效為止，其後即減少用量，使用至完全治癒為止。
- 臨床試驗證實Tobramycin可安全而有效的用於孩童。
- 本藥可和Biomycin Ophthalmic Solution併用。
- 本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

對於本品成份過敏的病患，禁用本品。

【注意事項】

- 本品不得注射於眼睛內。
- Aminoglycosides 對於特異體質病患可能引起過敏。
- 如果發生過敏現象，應立即停止使用本品。
- 本品和一般抗生素一樣，長期使用可能會引起抗性的微生物，包括黴菌。
- 如果超感染病發生，應有妥當治療之準備。
- 本藥膏可能延緩角膜傷口癒合。
- Tobramycin的成份之一Tyloxapol 不能與Tetracyclines藥品併用。
- 孕婦：以常人用量33倍之Tobramycin投用於三種不同的動物證實：Tobramycin對胎兒沒有不良影響，但尚未適當的試驗用於孕婦。由於動物試驗並不能代表人體之反應，如妊娠期間應於非用不可的情況下使用之。
- 授乳婦：為避免受哺乳之嬰兒引起副作用，先決條件必須決定停止哺乳或停止投與Tobramycin，並考慮對母體之重要性。

【副作用】

- Tobramycin眼藥水最普遍的副作用在對於眼睛局部的毒性及過敏，包括眼瞼搔癢、水腫，以及結膜發紅。100位病患中不到三人(3%以下)可能會發生這樣的副作用。一般Aminoglycosides抗生素藥品可能會發生相似的副作用。
- 其它副作用尚未發現於Tobramycin眼藥水之投與，但如將Tobramycin眼藥膏與其它類全身性作用的Aminoglycosides藥品併用時，應注意其血清濃度之總量。
- 實驗顯示Tobramycin Ophthalmic Ointment之副作用發生率(3.7%)比Garamycin Ophthalmic Ointment(10.6%)低很多。

【用藥過量】

超過用藥量對於一些病患可能引起上列副作用(例如點狀角膜炎、紅腫、淚水增加、水腫及搔癢)。

【包裝】

100公克以下鋁管裝、積層管裝。

【貯存】

25°C以下貯存。請將容器蓋子蓋緊。置本品於孩童無法觸及處。

1711-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司

臺南市永康區鹽洲里仁愛街 117 號