產品名稱	慮立定錠 Bropan Ta
衛生福利部 給證號碼	衛署藥

女使用，應警告病人若她想要或懷疑懷孕時，應向醫師聯繫相關停藥事宜。

因為本產品的藥理作用，對新生兒的影響是可預期的，像是體溫過低、肌肉張力減退和中度的呼吸抑制等，只有在符合嚴格的醫療適應症的條件下，才允許在懷孕最後三個月，或是在分娩時使用 Bromazepam。

此外，在懷孕較後期，長期使用 Benzodiazepines 的母親所生出的嬰兒可能會發展出生理依賴性，並且在出生後期間，可能會有發生戒斷症狀的危險。因為 Benzodiazepines 會通過到乳汁中，哺乳的婦女不可使用 Bropan。

副作用

Bropan 在治療劑量時可以被良好耐受，可能發生下列副作用：疲倦、嗜睡、肌肉無力、情緒麻木(numb emotions)、警覺力減退、精神混亂、頭痛、眩暈、運動失調(ataxia)或複視等。這些現象主要是發生在治療開始時，並且通常會隨著使用時間加長而消失。偶有胃小腸障礙、性慾改變和皮膚反應等的報告。

前行性失憶症可能會在治療劑量時發生，較高劑量時危險隨之增加。失憶作用可能與不當的行為有關，原有的憂鬱

107. 6.