



外用合成副腎皮質荷爾蒙製劑

安膚康乳膏 0.05%

Amfulan Cream 0.05%

"EVEREST"

"安膚康乳膏 0.05%"乃是本公司精取新合成副腎皮質荷爾蒙 - Fluocinonide 再配合基劑，所研製而成之優秀製品。其脂溶性或皮膚親和性均比 Fluocinolone Acetonide 佳，至於胸腺退縮作用，肉芽形成抑制作用兩者相同，但線維芽細胞抑制作用，毛細血管收縮作用，Fluocinonide 則為 Fluocinolone Acetonide 之數倍強。

【成分】每公克含：


Fluocinonide 0.5mg

【化學性質】

一般名：Fluocinonide

化學名： $6\alpha, 9\alpha, -\text{Difluoro}-11\beta, 21-\text{dihydroxy}-16\alpha, 17\alpha-\text{isopropylidene dioxy}-1, 4-\text{preguadiene}-3, 20-\text{dione}-21-\text{acetate}$

化學構造式：



性狀：Fluocinonide 係-白色結晶或結晶性粉末，無臭，易溶於氯仿，難溶於甲醇、乙醇，不溶於水。

【特徵】

1. 有強力消炎、抗過敏作用。
2. 有止癢效果。
3. 效果出現迅速而充分。
4. 使用精製無局部刺激性之基劑。
5. 脂溶性強，皮膚親和性高。

【適應症】

急性濕疹、慢性濕疹、乳幼兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎。

【用法、用量】

一日1~3回適量塗布於患處。
本藥須由醫師處方使用。

【副作用】-類固醇：

(A) 局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。

(B) 全身性：庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome)，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足 (secondary adrenal insufficiency)，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便祕或腹瀉等)。

【注意事項】

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師、藥師或藥劑生指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非醫師、藥師或藥劑生指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
6. 除非醫師、藥師或藥劑生指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非醫師、藥師或藥劑生指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
11. 除非醫師、藥師或藥劑生指示，類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。
12. 清淨患部，注意細菌感染，有細菌感染時，併用適量之抗生素，化學療法劑。

【警語】-類固醇

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
5. 皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

賦形劑：Vaseline、Cetyl Alcohol、Glyceryl Monostearate、Mineral Oil、Benzyl Alcohol、Methyl Paraben、Glycerol、Propylene Glycol、Polysorbate 80、SPAN 60、Corbopol-940、Citric Acid。

包裝：1000公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。

儲存：置於25°C以下

衛署藥製字第 050128 號



永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST
嘉義頭橋工業區工業三路 6-3 號
諮詢電話：(05)2218686(代表號)