

# “大豐” 愛蜜麗 乳膏

## Amoly Cream "T.F."

本劑為一複方製劑，對於粉刺之治療有效果。可促進上皮細胞的新陳代謝，抑制角質合成及防止面皰形成。另外可作為黑斑、雀斑治療劑，對老人痣、口服避孕藥誘發之肝斑及化粧品導致之皮膚黑色素沈積有消褪、漂白作用。

### ■ 成 分：每公克乳膏含：

Hydroquinone.....50mg  
Tretinoin.....0.3mg  
Dexamethasone.....0.3mg

■ 賦形劑：Squalane, Liquid Paraffin, Paraffin Wax, Butylated Hydroxytoluene, Tocopherol Acetate Alpha, Vaseline, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Ceteth-20, Propylene Glycol, Glycerin, Carbopol 940, Methylparaben, Propylparaben, Xanthan Gum, Edetate Disodium, Magnesium ascorbyl phosphate, Citric acid, Lavender, Water Purified。

### ■ 藥理作用：

1. Hydroquinone：局部塗敷有去除黑色素沈積作用。其機轉為抑制 tyrosine 轉變為 3,4-dihydroxyphenylalanine (dopa) 的酵素氧化過程，同時抑制了黑色素細胞的形成。
2. Tretinoin：為 Vit. A 在體內代謝後所產生的一種活性物質，可以促進上皮細胞增生，改進其角化過程，縮短角化時間，使角化細胞迅速脫落，於是粉刺的栓子鬆落脫出，不留任何痕跡。
3. Dexamethasone：為類固醇成分。對於皮膚炎症，搔癢等症狀有解除作用。

### ■ 適 應 症：

黑色素引起的色素過度沉著，例如伯洛克皮膚炎 (Berloque Dermatitis)-接觸性皮膚炎，過敏性皮膚炎，雀斑，老人斑，職業病帶來的色素過度沉著，里耳氏黑色素沉著症 (Riehl's Melanosis)，及疤痕的色素過度沉著。

### ■ 用法用量：

遵醫囑每日1-2次塗於患處，隨著症狀的減輕(1~2個月後)，可逐漸減少塗藥。長期或間歇性治療時可使用高防曬係數的防曬藥劑。

本藥須由醫師處方使用

### ■ 注意事項：

1. 若遇下列情形，亦請勿使用本劑：非因黑色素引起的色素沉澱，白斑，懷孕婦女，黑色素瘤，疑似黑色素瘤症狀，皮膚結核病，濾過性病毒引起的皮膚病等。
2. 避免眼睛、嘴唇、鼻黏膜與本劑接觸。
3. 需要用藥之色素沉澱患處不要置於高度陽光下曝曬。
4. 對本劑，或對維生素A酸過敏者，請勿使用本劑。

### ■ 副 作 用：

長期局部使用氟化類固醇，尤其是臉部，可能會引起皮膚萎縮，毛細血管擴張，以及粉刺。短期使用(1~3個月)本劑則未發現這些副作用。可能出現局部輕微但可消除的皮膚炎，然而不需因而中斷用藥。

衛署藥製字第052118號

■ 包裝：1000公克以下塑膠瓶裝、鋁軟管裝。

■ 儲存：25°C以下儲存。

GMP藥廠



大豐製藥股份有限公司  
公司·工廠：彰化市延平里岸頭巷11號