
"Union"
捷達
4.5gm / 20Vials
靜脈注射劑
4.5公克
Jeita
for I.V. Injection
4.5gm
UNION CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAIPEI TAIWAN
[成 分]
Each vial contains:
Piperacillin (as sodium) ..... 4 gm (potency)
Tazobactam (as sodium) ..... 0.5gm (potency)
[適應症]
對 Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對 Piperacillin / Tazobactam 有感受性之 β-lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。
GMP G-10836 衛署藥製字第 052361 號
Exp. Date
Lot No.
"聯 邦"
捷達
4.5gm / 20Vials
靜脈注射劑
4.5公克
Jeita
for I.V. Injection
4.5gm
聯邦化學製藥股份有限公司
台北縣蘆洲市正和街19號
[用法用量]
本藥應使用靜脈輸液給藥，給藥時間應超過30分鐘。
通常成人每日應用量為12g/1.5g至16g/2.0g，每六至八小時給藥4.5g。其餘請詳閱說明書後使用。
[儲 存]
本品請貯存於30℃以下且避光場所。
[注意事項]
請詳閱說明書
本藥限由醫師使用
177x135x80mm