

12×17cm

克菌寧殺菌液 2%

Easy Antiseptic Liquid 2%

粉紅色

【成分】每 mL 中含：

有效成分及含量：

Chlorhexidine Gluconate Solution 20% (w/v) 0.1 mL

(eq. to Chlorhexidine Gluconate 20 mg)

其他成分（賦形劑）：Ethanol、Lactic Acid、D&C Red No. 33、Purified Water。

【用途(適應症)】手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

【使用上注意事項】

● 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

● 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 3 歲以下。

2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

● 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

● 其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量或使用次數。

4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），
潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。

7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。

8. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，本藥勿使用於大面積之體表（以使用者的兩手掌面積為參考）。

9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

10. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

11. 本藥係以酒精為基劑，應避開火源。

12. 不可與清潔劑或其他化學藥品混合。

13. 若有非離子界面活性劑及陰離子等物質存在（如氯離子、碘化鉀）會降低 Chlorhexidine 效用，
而導致抗菌能力下降，請勿與此類產品併用。

【用法用量】使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用-塗抹適量於皮膚上，待乾燥。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

若有上述外之其他不適情況產生。

【包裝】4000 毫升以下塑膠瓶裝

【儲存】25°C 以下儲存

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 052435 號 GMP G-10846

藥商：寶齡富錦生技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街3號16樓

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路266號



DP2038A01IN04