衛署藥製字第055102號
GMP G-11028

貝膚恩軟膏

Bacipin Ointment

【成　　分】Each gm contains

有效成分及含量：Neomycin Sulfate…… 5.83mg
(Eq. to Neomycin (Potency)……3.5mg)
Polymyxin B Sulfate……0.83mg
(Eq. to Polymyxin B (Potency)……5000Unit)
Bacitracin Zinc……10mg
(Eq. to Bacitracin (Potency)……400Unit)

其他成分（賦形劑）：White Petrolatum

【用途（適 應 症）】

緊急處理、預防因皮膚外傷（如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷）造成的感染或減緩傷口的感染。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
1.曾因本藥成分引起過敏。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1.有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
2.3歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1.兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：
1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射。
3.勿超過建議使用量或使用次數。
4.使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
5.本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
6.本藥勿使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。
7.使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
8.長期使用有可能引起繼發性感染。
9.請勿使用超過7天以上。
10.請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
11.使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

【用法用量】：

每日1-3次	局部清潔後，適量均勻塗抹（撒佈或噴灑）於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋

【警　　語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹等過敏性皮膚炎、繼發性感染（在抵抗力減弱的情形下，被另一種新的病菌感染）
耳朵	耳毒性
腎臟	腎毒性

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1.若有上述外之其他不適情況產生。
2.使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包　　裝】

100公克以下鋁軟管、塑膠罐裝，1000公克塑膠罐裝。

【類　　別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲　　存】

儲存於30℃以下。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號