130mm

悅喜滴® 抗凝血溶液 A

Anticoagulant Citrate Dextrose Solution A "Otsuka"

衛署藥製字第 055410 號　　本藥限由醫師使用

【成 份】

Each mL contains :

Sodium Citrate Dihydrate.....22.0 mg (eq. to Sodium Citrate Anhydrate.....19.3mg)
Citric Acid Monohydrate.....8.0 mg (eq. to Citric Acid Anhydrate.....7.3mg)
Dextrose Anhydrate.....22.3 mg
Water for Injection add to.....1.0 mL

【適應症】

血液抗凝劑。

【用法· 用量】

1. 人血每 100mL 使用本品 15 mL。
2. 混合操作方法：
   (1) 依照相關的連接管組 (set) 內所附的說明，注意防止污染下操作。
   (2) 拉去瓶口上方拉環。
   (3) 毋須移去或損壞之情況下，即可用注射針或引流器具刺穿橡皮栓，並進行引流混合。
3. 已滅菌無熱原之抗血液凝固劑，提供細胞分離術或血液分離術使用。

【注意事項】

1. **本品不得直接使用於靜脈注射。**
2. **蓋上的拉環可保護彈性橡皮栓保持於無菌狀態下，因此直到準備使用時，才拉除拉環。**
3. **容器中之本品可供多次引流，注入使用，但當日未引流、混合完畢之殘餘液，必須拋棄不可使用，因為其無菌性可能受到損害。**
4. **取用時：**
   (1) 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發有上述情形時，請勿使用。
   (2) 本品為無色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
5. **連接管組、引流器具選用及插入法：**
   (1) 請依連接管組、引流器具使用方法正確使用。
   (2) 穿刺導入針請以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割 (Coring) 產生碎片。
   (3) 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。
6. **除非溶液澄清，否則不予使用。**
7. **保持產品無菌性。**
8. **避免過熱、避免冷凍。**

【不良反應】

過高的抗凝血劑可能引起枸櫞酸的捐血反應 (Donor Reaction)。

【貯存】

30℃以下貯存。

【包 裝】

500mL 塑膠瓶裝；100 支以下箱裝。

【有效期限】

請見標籤或外箱上之標示。

Otsuka
製造廠：台灣大塚製藥股份有限公司 中壢工廠
地　址：桃園縣中壢市吉林路 15 號
藥　商：台灣大塚製藥股份有限公司
地　址：台北市復興北路 378 號 11 樓

EP4001

260mm

大塚悅喜滴仿單.indd 1　　2010/10/29 下午 2:15