衛署藥製字第055580號
PIC/S優良藥品
G.M.P. G-11187

歐業酸痛藥布

Ou Yeh Ache Plaster

【特點】
本品適用於肩關節周圍炎、腱、腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨關節炎、筋肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸多同痛症狀的暫時緩解。

【成分】**有效成分及含量**：每片14g（膏體重，10cm×14cm）
Indomethacin 85mg
其他成分（賦形劑）：Perified Water、Glycerin、PVA Solution、Sodium Polyacrylate、Sorbitol Solution、Nikasol TS-620、Kaolin、Carboxymethylcellulose Sodium、L-Menthol、Sodium Polyacrylate Starch、Alcohol、Tween 80、Nonion OP-80R、Titanium Dioxide、Isopropyl Myristate、N-Methyl-2-Pyrrolidone、Tartaric Acid、Aerosil 200。

【用途（適應症）】暫時緩解局部疼痛。

【使用上注意事項】：
一、有下列情形者，請勿使用：
1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 深部皮膚組織感染。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 2歲以下兒童。
2. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
3. 曾經對藥品或化妝品有過敏的人（皮膚起疹子、紅斑、搔癢等）。
四、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 使用本藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
5. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
6. 本藥勿使用於大面積之體表（以使用者的兩手掌面積為參考）或皮膚深部感染。
7. 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
8. 本藥不可使用超過二星期。
9. 為了確保品質，未使用的貼片應放置在袋內，並將拉鍊密閉。
10. 本藥勿使用於濕疹、癢疹、傷口之皮膚。

【用法用量】

次數	依患部情況給與適當增減使用，次數通常一日1次貼於患部，慢性疾患可一日換貼2～3次。
方式	1. 切割成適當大小，剝去表面薄紙貼於患部使用。 2. 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。 3. 於關節等易脫落之部位，可用粘著性膠帶或伸縮繃帶固定。

【警語】
一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	騷癢、灼熱感、局部發紅、發癢等過敏症狀。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 使用後自覺狀況未改善或更惡化。
2. 發生視覺問題（視力糢糊、視力減退）或白血球減少症（出現症狀：發燒、喉嚨痛）或血小板減少症（出現症狀：出血，包括牙齦流血、皮膚有紫斑或點狀紅斑、大便有血或解黑便）或顆粒性白血球缺乏病（出現症狀：發燒、喉嚨痛）或腸胃出血（血便）或尿血症（尿液中有血（絲））。

【包裝】14g（膏體重）（10cm×14cm）鋁箔袋裝
【儲存】避免日光直射，貯存於30℃以下。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品
【諮詢電話】07-7355113

委託者：歐業藥品股份有限公司
高雄市鳥松區松埔路11-10號 電話：(07)7355113
製造廠：得生製藥股份有限公司二廠
台南市永康區環工路42-1號

OUYeh
Ou-Yeh Pharmaceutical
通用藥害救濟基金
RELIEF FUND COVERED