

**作用**

本品含4種成分，能有效用於皮膚搔癢、過敏、發炎、疼痛等症狀。

- ◎Hydrocortisone acetate具有消炎及抗過敏作用。
  - ◎Dibucaine為局部麻醉劑(Local Anesthetic)，其表面麻醉作用大於Lidocaine，可減少傷口或黏膜之刺激性。
  - ◎Diphenhydramine HCl具止癢及抗過敏作用。
  - ◎Zinc oxide可緩解皮膚刺激性具收斂作用。
- 各成分併用可緩解局部過敏、疼痛及止癢作用。

**成分**

**有效成分及含量(每克含)：**

- Hydrocortisone acetate ..... 10 mg
  - Dibucaine ..... 10 mg
  - Diphenhydramine HCl ..... 20 mg
  - Zinc oxide ..... 50 mg
- 其他成分(賦形劑)：Menthol、Tefose 63、Myristyl myristate、Octyldodecanol、Dimethicone、Propyl paraben、Octyldodecyl myristate、Aloe、Methyl paraben、Purified water、Jasmine essence、Bouquet essence。

**用途(適應症)**

暫時緩解濕疹、尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

**▲ 使用上注意事項**

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (2) 2歲以下兒童。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (1) 3歲以下。
  - (2) 有深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
  - (1) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (2) 要使用於臉部。
- 四、其他使用上注意事項：
  - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (2) 避免陽光直射。
  - (3) 勿超過建議使用量或使用次數。
  - (4) 使用部位或周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
  - (5) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  - (6) 本藥限於皮膚外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
  - (7) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
  - (8) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
  - (9) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  - (10) 請勿使用超過7天以上。
  - (11) 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
  - (12) 請勿用在患部以外，也勿當作預防使用。
  - (13) 皮膚的黴菌或細菌性感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

- (14) 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
- (15) 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
- (16) 不得大量使用，以避免全身性吸收，曾有致死報告。

**用法用量**

一天2-4次 塗抹薄層，以可覆蓋患部為主。

**▲ 警語**

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張、局部灼熱、刺痛、過敏性反應。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

**包裝**

1000公克以下鉛軟管、塑膠瓶裝。

**類別**

醫師藥師藥劑生指示藥品。

**儲存**

25℃以下儲存。



如對產品在使用上有任何疑問，本公司專業藥師將竭誠為您服務  
諮詢專線

**☎049-2253190**

服務時間 8:00~17:00 (例假日除外)  
網址 <http://www.yuanzhou.com.tw>

