牛奶

衛署藥製字第056766號
G-11437

胃鈣寧錠500毫克

Gaining Tablets 500mg

【作　　用】：本藥為非全身性制酸劑，能中和、緩衝胃酸，緩解與消化道潰瘍有關的症狀，如：胃灼熱、胃酸過多等。

【成　　分】：

有效成分及含量：每錠含(Each tablet contains)

Calcium Carbonate.....500mg

其他成分(賦形劑)：Tartrazine Aluminum Lake、Mannitol、Tapioca Starch (Fd821)、Saccharin Sodium、Maltodextrin、Magnesium Stearate、Talc、Sodium Starch Glycolate、Milk Powder、Purified Water.

單次劑量(1錠)之酸中和能力為9mEq以上。

【用途(適應症)】：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

(二)未滿3個月之嬰兒。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)3歲以下。

(二)消化道潰瘍的人。

(三)有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

(五)如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。

(六)腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。

(七)可能引起腹脹、打嗝。

(八)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】：

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	1 日 3 至 4 次，或需要時服用。每次一錠。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人使用量之 1/2
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人使用量之 1/4

【警　　語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包　　裝】：6~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【類　　別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲　　存】：本品請置於25℃以下，並避光存放。

PIC/S G.M.P.

委託者：天下生物科技股份有限公司

製造廠：井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

TEL：(04)26814585-7(三線)

諮詢專線：(0800)461461