

"元宙" 喜滅痛 錠

Flugalin Tablets "Y.C."

衛署藥製字第 056790 號
GMP G-11459

【成份】 Each tablet contains:

Flurbiprofen 100 mg

【適應症】 風濕性關節炎、骨關節炎、關節強硬性脊椎炎、經痛。

【用法用量】 通常初劑量為每日200~300 mg，分2~4次投與。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】(一)一般注意事項：

1. 對本藥曾有過敏反應病歷之患者，應小心使用。
2. 服用期間要注意是否有胃腸道潰瘍、出血之現象。
3. 本藥對兒童使用之安全性尚待進一步確定，使用時宜特別小心。

(二)對下列患者須慎重投與：

1. 腎、肝功能異常者。
2. 服用抗凝血劑Aspirin、 β -腎上腺素阻斷劑、Cimetidine、Ranitidine及利尿劑之患者。

(三)副作用：

1. 胃腸道：可能有消化不良、腹瀉、腹部疼痛、噁心、便秘、胃腸出血、脹氣、嘔吐等症狀。
2. 中樞神經系統：有時出現會頭痛、神經緊張、焦慮、健忘等現象。
3. 呼吸道：鼻炎。
4. 皮膚：可能有潮紅之現象。
5. 生殖泌尿器官：若有泌尿道感染之現象應暫停使用。
6. 全身性：水腫。
7. 代謝方面：體重改變。
8. 其他：可能有暈眩、耳鳴、視覺模糊之現象。

(四)孕婦及授乳婦人之投與：

對孕婦及授乳婦人之安全性尚未建立，對於孕婦及可能懷孕之婦女或授乳之婦人須判斷其治療效益超過危險性時方予投與。

【禁忌症】 1. 反覆發作之消化性潰瘍或消化性潰瘍導致出血、穿孔之患者。

2. 嚴重肝衰竭。

3. 嚴重腎衰竭。

4. CABG患者之手術期間疼痛。

5. 對本藥過敏者。

6. 對阿斯匹靈(aspirin)或其他NSAID產生下列過敏症狀之患者：氣喘、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管性水腫(angioedema)。

【警語】 第三期之孕婦使用本類NSAID藥物有可能引起動脈導管(ductus arteriosus)提早封閉，更應慎重使用。

【賦形劑】 Starch、Carboxymethylcellulose calcium、Lactose monohydrate、Pregelatinized starch、Primojel、Tartrazine aluminum lake、Magnesium stearate。

【儲存】 本品應置於緊密容器中，於25°C以下陰涼處貯存之。

【包裝】 4-1000錠鉛箔盒裝、塑膠瓶裝。



元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路272號
T E L : (0 4 9) 2 2 5 3 1 9 0