Antila®

肝活素 膠囊 150毫克

Hepanamin® Capsules 150mg

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第057754號

符合國際PIC/S GMP標準
衛部藥廠證字第(AP)0461147號

膠囊150毫克

作用

肝活素膠囊150毫克是由天然植物Silybum Marianum萃取而來之有效成分，能促進肝臟代謝的功能，加速受損肝組織復原，增進肝臟的解毒作用，藥性溫和，不傷腸胃，口服後可迅速為人體吸收，並發揮保護肝臟的作用。

成分 Each Capsule Contains

有效成分及含量：
Exsiccated Fructus Cardui Mariae Extract
(eq to 150mg of Silymarin Calculated as Silybin)–––230.8 mg

其他成分(賦形劑)：
Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Hard Gelatin Capsules #0 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Titanium Dioxide、Glycerol、New Coccin、Sunset Yellow FCF、Brilliant Blue FCF)

用途(適應症)

慢性肝病之佐藥。

⚠ 使用上注意事項

1.有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
2.有下列情形者，使用前請洽醫師診治：正在服用其他藥物的人。
3.有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
4.其他使用上注意事項：
❶ 為防止兒童誤食請妥善保管。
❷ 避免陽光直射。
❸ 此藥品為慢性肝病治療的輔助藥品，使用後還是需要定期檢查肝臟功能。

用法用量

每次一粒，每日1至2次。維持劑量：1天2粒。用量依病情輕重於飯後服用。

警語

一. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃 腸 道	噁心、嘔吐、腸胃不適等。
其 他	皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀。

二. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫生診治：
1.有任何不適情況產生。
2.全身過敏性反應，如皮膚癢疹、蕁麻疹、光過敏性皮膚炎、呼吸困難、喘息、喉嚨痙攣、支氣管痙攣等。

包裝

2-1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

儲存

30℃以下

德英生物科技股份有限公司
G&E HERBAL BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
台南市安南區科技五路92號

Antila®

肝活素 膠囊 150毫克

Hepanamin® Capsules 150mg

版面重排

移除

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第057754號

符合國際 PIC/S GMP 標準
衛部藥廠證字第 (AP) 0461147 號

膠囊150毫克

作用

肝活素膠囊150毫克是由天然植物Silybum Marianum萃取而來之有效成分，能促進肝臟代謝的功能，加速受損肝組織復原，增進肝臟的解毒作用，藥性溫和，不傷腸胃，口服後可迅速為人體吸收，並發揮保護肝臟的作用。

成分 Each Capsule Contains

有效成分及含量：
Exsiccated Fructus Cardui Mariae Extract
(eq to 150mg of Silymarin Calculated as Silybin)---230.8 mg

其他成分(賦形劑)：
Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Hard Gelatin Capsules #0 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Titanium Dioxide、Glycerol、New Coccin、Sunset Yellow FCF、Brilliant Blue FCF)

修改

用途(適應症)

慢性肝病之佐藥。

使用上注意事項

1.有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
2.有下列情形者，使用前請洽醫師診治：正在服用其他藥物的人。
3.有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
4.其他使用上注意事項：
❶ 為防止兒童誤食請妥善保管。
❷ 避免陽光直射。
❸ 此藥品為慢性肝病治療的輔助藥品，使用後還是需要定期檢查肝臟功能。

用法用量

每次一粒，每日1至2次。維持劑量：1天2粒。用量依病情輕重於飯後服用。

警語

一. 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃 腸 道	噁心、嘔吐、腸胃不適等。
其 他	皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀。

二. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫生診治：
1.有任何不適情況產生。
2.全身過敏性反應，如皮膚癢疹、蕁麻疹、光過敏性皮膚炎、呼吸困難、喘息、喉嚨痙攣、支氣管痙攣等。

包裝

2-1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

修改儲存條件寫法

儲存

30℃以下

德英生物科技股份有限公司
G&E HERBAL BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
台南市安南區科技五路92號