
愛爾康縮瞳液
MIOSTAT
(Intraocular Carbachol 0.01%)

衛署藥輸字第012714號

說　明：MIOSTAT是一種含 carbachol 之無菌均衡鹽溶液，可做為眼內注射劑。
其主成份化學結構如下：



俗　名：Carbachol
化學名：Ethanaminium, 2[(amino-carbonyl)oxy]-N, N, N-trimethyl, chloride.

成　份：是一種無菌溶液，每一公撮含:
主成份：Carbachol.....0.01%
賦形劑：Sodium Chloride 0.64%，Potassium Chloride 0.075%，Calcium Chloride Dihydrate 0.048%，Magnesium Chloride hexahydrate 0.03%，Sodium Acetate Trihydrate 0.39%, Sodium Citrate Dihydrate 0.17%，Sodium Hydroxide/Hydrochloric Acid（調整 pH）Water for Injection

藥理作用：
Carbachol 為強力膽鹼Potent Cholinergic Agent (類交感反應)劑，可引起虹膜及睫狀體收縮以降低眼壓。Carbachol降眼壓之真正機轉尚未確認。

適 應 症：
預防白內障手術後24小時內眼內壓之升高，縮瞳劑。
說明：眼內手術需緊急縮瞳時使用。

禁　忌：對本劑成分敏感之人忌用。

警　告：
眼內單次使用為限，用剩之部份需拋棄。Carbachol 0.01 %於急性心臟衰竭、支氣管氣喘、胃潰瘍、高血壓等病狀之病人使用時，或有胃腸平滑肌痙攣、小便障礙，以及帕金絲病患使用時均應特別小心。

注意事項：
致癌性：動物實驗未發現具有致癌性。
孕 婦：孕婦類別C.本品尚未有對孕婦作適當及控制良好之研究報告。只有在權衡益處大於對胎兒之危險性時才得以使用本品。
授乳婦：本品是否會由乳汁分泌未知。授乳婦使用本品應予以警告。
幼兒使用：幼兒使用本品之安全性及有效性尚未建立。

副 作 用：
眼部：角膜混濁，持續性水疱角膜病變，視網膜剝離及曾有白內障手術後使用本品而發生虹彩炎的報告。
全身性：對 Carbachol 之使用結果可能有視覺不易調節、面紅、出汗、胃出血、腹痛、膀胱收緊、頭痛等反應症狀。

用法用量：
於打開外包裝後，內部之無菌瓶即倒在一無菌碟上備用。將溶液抽入乾燥之無菌注射器中並在使用前以Atraumatic彎管將針頭更換，輕輕將半公撮份量之溶液注入前部眼皮下以造成縮瞳效果，可以在縫合之前或後滴入。縮瞳效果在本劑使用後2-5分鐘效果最顯著。
本藥限由醫師使用。

包　裝：1.5公撮小瓶裝，12小瓶盒裝。

儲　存：存放在攝氏15~30度室溫。

製造廠：Alcon Laboratories , Inc.,
廠　址：6201 South Freeway , Fort Worth , 76134 Texas , U.S.A.
藥　商：瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司
台灣分公司
新北市新店區寶中路119號4樓
電　話：(02)2917-2468