愛 煩 悶 錠 3 公絲

AKAMON Tablets 3mg

衛署藥輸字第 013409 號

主成分：每錠含 Bromazepam 3mg

賦形劑：Lactose Monohydrate, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate,

適　應　症：焦慮狀態

用法 / 用量：本藥須由醫師處方使用

急症病患平均用量：3mg, 1 天 2-3 次

嚴重時，尤其在醫院裡：6-12mg

1 天 2-3 次

這是一般推薦用法，每人用法視情況而定。治療急救病患時應先由少量開始，逐漸增至最大量，經幾個禮拜後，視反應而減少用量，然後停止服用。

副　作　用：愛煩悶錠藥性緩和，甚至高劑量時，根據調查，其對造血、肝或腎之功能都無副作用，對老年患者及服鎮靜劑者應根據其反應而注意其用量。

注　　意：愛煩悶錠如和其他主要藥劑併用時，可有更大的鎮靜作用。而且，愛煩悶錠不能和酒精同時服用，因無法預測個人反應。愛煩悶錠對每個人有不同抑制作用，視個人接受性而定，愛煩悶錠不適合懷孕或授乳婦女。

- 併用 Opioid 類藥品

Opioid 類藥品與 benzodiazepine 類藥品或其他中樞神經系統抑制劑（包括酒精）併用，可能導致重度鎮靜（profound sedation）、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

包　　裝:2-1000 粒盒裝。

儲存條件：儲存在 25℃以下之乾燥處。

製　造　廠: MEDOCHEMIE LTD.(CENTRAL FACTORY)

地　　址: (O)1-10, Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Cyprus

(P) 1-10, Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Cyprus

藥　　商:雙正貿易股份有限公司

地　　址:台北市忠孝東路 5 段 508 號 6 樓之 3

電　　話:(02)2346-2168~70

Ak202104