
Doctor Recommended
KONSYL®
SUGAR FREE
康賜爾散劑
6.0 grams PSYLLIUM HYDROPHILIC MUCILLOID per packet
NATURAL FIBER THERAPY
BULK-FORMING LAXATIVE
VERY LOW SODIUM
NO SUGAR OR SUGAR SUBSTITUTES
Doctor Recommended For Over 35 Years!
NET WEIGHT: 6.0 grams
(Fill controlled by weight, not volume.)



主成份：每公克含　　衛署藥輸字第014837號
1公克之Psyllium Hydrophilic Mucilloid
包裝：每包6.0公克。　適應症：軟便。　　醫師處方用藥

用法用量：成人：每次一小包，每天服用1～3次，飯前、飯後或睡前、或由醫師指示使用。兒童：6歲左右約成人劑量的一半或由醫師指示服用。

注意事項：1.為防止兒童誤食請妥善保管。2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。3.除非有醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師。5.瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

警語：1.除非有醫師指示，不得併用其他瀉劑。2.除非有醫師指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。3.[illegible]使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師。4.若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。5.使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。6.使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師。7.除非有醫師指示，未滿3歲之嬰幼兒不得使用。8.禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心、腸道潰瘍、狹窄或粘黏之患者。9.需12小時至三天才會發生作用。10.不適用於須限制水份之患者。11.使用時須依指示加足量水服用，否則易引起胸痛、嘔吐、口水過多、容易噎到等食道阻塞之症狀或徵候，須停止使用並請教醫師。　28887 09/05

製造廠：Konsyl Pharmaceuticals Inc.
Plant:8050 Industrial Park Road,
Easton, Maryland 21601, U.S.A.
藥商：李生實業股份有限公司
公司：臺北市松江路520號6樓　電話：(02)2596-9[illegible]38