


外盒、仿單、標籤粘貼表

89.5.23

產品名稱	維克得顆粒	申請廠商	輪亨實業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥輸字第	016241	號



σ
20016943

BLOCHE TASI®

sigma-tau

20 envelopes
20 sobrecitos
20 sachets



sigma-tau
industrie farmaceutiche
riunite s.p.a. - pomezia - italy

1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 1 1
2 2 3 3 4 4

000000
000000



BIOCHEASI[®]

7



E.P.-B 709293

Registr. No. 015784034 Ministry of Health - Italy

COMPOSITION: each sachet contains: **Active ingredients:** sodium citrate mg 425.0; potassium citrate mg 50.0; thiamin diphosphate free ester mg 50.0; monosodium riboflavin 5-monophosphate mg 25.0 (equal to mg 23.8 of free acid); vitamin B₆ hydrochloride mg 12.5; citric acid mg 100.0. **Excipients:** malic acid, sorbitol, tartaric acid, sodium bicarbonate, polyvinylpyrrolidone, orange flavor, saccharin, sodium edetate, propyl gallate, sucrose, fructose, glucose.

INDICATIONS: gastric acidosis, maldigestion, hepatic dysfunction, ketosis, gestational nausea.

DOSAGE: adults: 2 envelopes three times daily dissolved in half a glass of water. Children: half of the adult dose.

COMPOSICIÓN: un sobrecito contiene: **Principios activos:** sodio citrato mg 425.0; potasio citrato mg 50.0; éster libre de tiamina difosfato mg 50.0; riboflavina 5-fosfato mg 25.0 (equivalente a mg 23.8 de ácido libre); vitamina B₆ clorhidrato mg 12.5; ácido cítrico mg 100.0. **Excipientes:** ácido málico, sorbitol, ácido tartárico, bicarbonato de sodio, polivinilpirrolidona, aroma de naranja, sacarina, sodio edetato, propil gallato, sacarosa, fructosa, glucosa.

INDICACIONES: gastritis, indigestión, disfunción, hepática, cetosis, náusea gravídica.

POSOLOGÍA: adultos: 2 sobrecitos 3 veces cada día, diluidos en medio vaso de agua. Niños: mitad dosis.

COMPOSITION: chaque sachet contient: **Principes actifs:** citrate de sodium mg 425.0; citrate de potassium mg 50.0; thiamine diphosphate ester libre mg 50.0; riboflavine 5-phosphate monosodique mg 25.0 (équivalent à mg 23.8 d'acide libre); vitamine B₆ chlorhydrate mg 12.5; acide citrique mg 100.0. **Excipients:** acide malique, sorbitol, acide tartarique, bicarbonate de sodium, polyvinylpyrrolidone, essence d'orange, saccharine, sodium edetate, propyl gallate, saccharose, fructose, glucose.

INDICATIONS: acidose gastrique, troubles digestives, troubles hépatiques, cétose, nausée lors de la grossesse.

POSOLOGIE: 2 sachets trois fois par jour dilués dans de l'eau. Enfants: demie dose.

ab
SS050801

Lot 150409
Exp. 02 2018

