

帝化眼藥水

衛署藥輸字第 017147 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

TEIKA EYE DROPS TOP

最近吾人生日常生活環境中，事情複雜而繁多，需要使用眼睛的場合有逐漸增多的傾向。如長時間的觀賞電視或用功讀書以及其他繁雜工作時，因眼睛過度疲勞之關係，時而會有眼睛模糊看不清事物的感覺發生，此時請滴用本藥。帝化眼藥水能緩和這些症狀。

【成分】

有效成分	含量	有效成分	含量
Allantoin	0.1%	Taurine	0.5%
Dipotassium Glycyrrhizinate	0.1%	Neostigmine Methylsulfate	0.002%

其他成分(賦形劑)：

Benzalkonium Chloride, Boric Acid, Sodium Borate, Polysorbate 80, l-Menthol, d-Borneol, Purified Water

【用途(適應症)】

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適，眼睛疲勞

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人
- 三、其他使用上注意事項：
 - 1) 為防止兒童誤食請妥善保管
 - 2) 避免陽光直射
 - 3) 使用前，請洗淨雙手
 - 4) 請依照藥品標示使用
 - 5) 以下情形，請勿繼續使用。
 - a. 超過保存期限的眼藥水
 - b. 開瓶超過 28 天後
 - c. 藥液混濁、變色或出現異物時
 - 6) 為避免汙染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝
 - 7) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 - a. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏
 - b. 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上
 - 8) 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水

【用法用量】

一天 3 至 4 次	每次 1 至 2 滴
------------	------------

【警語】

一、 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身 體 部 位	副 作 用
皮 膚	發疹、發紅、搔癢
眼 睛	充血、搔癢、浮腫

二、 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1)連續使用三天症狀沒有改善
- 2)使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺痛感
- 3)若有任何不適情況產生

【包裝】 100 毫升以下塑膠瓶裝

【儲存】 保存於 25°C 以下



藥商：德佑藥品有限公司 台北市敦化南路一段 3 號 2 樓

製造販売元：テイカ製薬株式会社 日本國富山市荒川一丁目 3 番 27 号

製造廠：TEIKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

3-27, Arakawa 1-Chome, Toyama, 930-0982, Japan

