百力特®點眼懸浮液

Poly-Pred® Liquifilm® Ophthalmic Suspension

衛署藥輸字第 018646 號

成份：

每毫升含 Prednisolone acetate 5mg, Neomycin Sulfate (equivalent to 3.5mg neomycin base) 5mg, Polymyxin B Sulfate 10000 units, Liquifilm (Polyvinyl alcohol) 14mg, Polysorbate 80, Propylene glycol, Sodium acetate trihydrate, Thimerosal 以及 Purified Water。

適應症：

類固醇局部抗發炎製劑暨抗感染製劑。

說明：

Poly-pred 可用於治療眼睛疾患，需要抗發炎治療以及若合併有對 Neomycin 或 Polymyxin 有感受性的菌種所導致的併發性感染如：

結合膜炎、瞼結合膜炎、鞏膜炎、非疱疹性角膜炎、淚囊炎、術後預防感染、異物侵入(包括化學及熱灼傷)所引起之炎症。

禁忌：

急性單純性疱疹(樹枝狀角膜炎)、牛痘、水痘、眼結核及由黴菌、病毒感染之眼疾、或任何對主成份過敏者。

警語：

1. 類固醇製劑的使用可能會遮蔽或加重微生物感染之眼疾。
2. 曾有報告在長期使用局部類固醇後，會發生後囊下白內障或眼內壓上升，應經常檢查眼內壓。
3. 有些疾病及長時間投與局部類固醇會引起角膜變薄，使用局部類固醇製劑時，有可能造成角膜穿孔。
4. 長時間使用局部類固醇有可能使遮蔽性微生物過度滋長，當因此引起二次感染時，則停止投藥，並給與適當處置。
5. 長時間使用後，若慢性眼部發炎現象仍在，則應考慮黴菌感染的可能性。
6. 對曾有單純性疱疹病史的病患投與類固醇製劑應特別小心。
7. 在眼部急性化膿性狀況下，類固醇有可能會遮蔽或加重感染的情形。
8. Neomycin Sulfate 有引起皮膚敏感之潛在可能性，但確實發生率不明。

注意：

尚未確立對孕婦局部投與類固醇的安全性，所以在懷孕期間不宜長時間或大量投與類固醇，對兒童的安全性及有效性未建立。

用法用量：

治療眼球：每 3-4 小時 1 滴或需要時可增加投與次數。

治療眼瞼：每 3-4 小時 1 滴，並閉上眼睛輕揉眼瞼。

治療眼旁周圍：當發炎現象同時出現在眼睛及眼旁周圍皮膚時，藥水可直接分佈到發炎部位，再讓其自然乾即可。

包裝：

5ml 塑膠點眼滴瓶。

儲存在 15˚C-25˚C 間，避免冷凍，避免被孩童拿到。

本藥須由醫師處方使用。

使用前請先搖晃均勻。

版本日期：2015 年 4 月

製造廠：Allergan Pharmaceuticals Ireland

廠址：Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland

藥商：台灣愛力根藥品股份有限公司

地址：台北市羅斯福路二段 102 號 9 樓

電話：(02)2366-9888

©2015 Allergan, Inc.

®marks owned by Allergan, Inc.